

本草綱目序

紀稱望

故萍

稱筆

僅是

予弁山

身也

身也
數日予
洞厥

數日予

東壁

稱倚

洞厥

現寶氣



中藥材商品規格小冊子

統籌機構：香港中藥藥劑師協會



中藥材商品規格小冊子

主編 | 周若龍博士
統籌 | 香港中藥藥劑師協會

中藥材商品規格小冊子

編委會

主編：

周若龍

副主編：

區靖彤、鄭桂珍

編輯成員：

楊慧媚、黃錦榮、魏柏儒、蔡文方、張棟健、陳榮鋒

編輯助理：

周嘉晴、梁嘉怡、王曉彤

拍攝：

陳倬賢、溫劍忠

統籌機構：



香港中藥藥劑師協會

香港中藥藥劑師協會（前身：香港中藥師協會）於 2015 年正式宣告成立，是一個非牟利之組織；本會以推動香港中藥藥劑專業化發展為己任，積極配合政府政策，建立與政府部門和同業間的溝通橋樑，為社會及市民謀取公益。

本協會會員主要為本港中藥專業人員（包括獲國家執業藥師（中藥學）資格、中藥學學士學位人士、在職提名人 / 副手或 GMP 藥廠關鍵人員等），致力香港中藥發展，希望通過這平台向政府表達業界聲音，協助政府推動與實施有利中藥行業規範化、現代化及專業化的政策，最終有利於香港市民的用藥安全，令香港銷售的中藥得到更大的保障。

序言

中國香港（下稱香港）的中藥貿易歷史悠久，可以追溯到宋元時期。香港地理上位於珠江三角洲邊陲，靠近廣州，是大江、大陸、大洋的交匯點，自古以來是海上絲綢之路的中轉站，商船來往廣州，必經香港水道，屯門、九龍灣、竹篙灣等均是商船的天然良港，讓商船停泊和補給。隨着海上絲綢之路的貿易往來，中藥貿易逐漸紮根香港。到了明清時期，香港中藥貿易得到了進一步的發展並形成了獨特的地域特色，「南北行」、「高陞街」這些與中藥相關的貿易行業和中藥材集散地成為了代表，逐漸形成香港獨有的商品規格。香港特色飲片是指在香港地區具有獨特加工工藝和使用方法的中藥材，經過特殊處理後形成的一種飲片形式，其分類主要依據原料種類、加工工藝及臨床應用的不同而有所區別。香港浸會大學中藥標本中心收藏了部分香港特色中藥飲片，如黃芪長縱壓片、當歸白大歸片（白二歸）、西歸頭、茯苓卷、天麻齊手片、續斷縱壓片等。

這些以外貿為主的中藥商品的片形均具有以下特徵，包括外形美觀（如剪參）、齊整（如齊手片）、大面積（如壓片）等，在上世紀二戰後，成為優質中藥商品的標誌。當時，香港中藥出口佔全球市場的比例並沒有明確的統計數字，但可以確定的是，香港憑藉其自由港的地位和便利的貿易環境，成為中藥產品（如草藥、藥材和中成藥）的重要集散地。香港的中藥出口量在亞洲地區佔有相當大的份額，尤其是對東南亞華人社區的供應，引領中藥商品規格的走向。直至今日，東南亞的中藥商店所出售的中藥商品，仍多數保留香港獨有的特色規格。

中藥材商品規格是指對中藥材的品質、性狀、來源、加工方法等方面進行規範的標準，它的發展經歷了從傳統經驗到現代科學的過程。早期中藥材主要依賴於藥農和藥商對外觀要求、使用經驗或地域習慣，而形成獨特炮製加工的商品規格，優良的中藥商品經過歷代醫家和顧客的認可，開始以炮製方式、加工片形或道地產區作為中藥商品或規格的命名，部分更成為了中藥品質保證的名片（如黑蠶芪、東阿阿膠、建曲等）。近年來，隨着人們對健康意識的提高，以及傳統醫學在全球範圍內的廣泛應用，中藥材作為傳統醫學的重要組成部分受到了越來越多的關注。我國以至不同國家或地區已開展制定中藥材標準，如《中華人民共和國藥典》、《香港中藥材標準》等。隨着現代科學技術的應用，中藥材逐漸形成了一系列標準化體系，包括性狀鑒別、顯微鑒別、理化鑒別等方法，並且在國家和地方層面上制定了相應的法律法規和行業標準，為中藥材的安全性、有效性和穩定性提供切實可行的基礎保障，對規範中藥材市場、保障用藥安全以及促進傳統醫學的發展具有重要的現實意義。

然而，在中藥材標準的基礎上，所衍生的中藥材商品卻五花八門，品質參差不齊，而有關商品規格卻直接與價格掛鉤，導致中藥材商品沒有規範。儘管中藥材已符

合安全、療效等一系列標準，但不同品規的中藥所涉及的售價可以差距明顯，不但直接導致消費者在採購中藥材商品時出現信心危機，也間接影響中藥產業的健康發展。

不同地區的中藥材商品規格的異迴，最明顯莫過於中國內地與香港部分中藥商品的差異。姑勿論兩者之間誰優誰劣，兩地用藥品規的差異將有礙兩地中藥材產業的交流與合作，例如香港獨有的「黑鑫芪」在中國內地鮮見，傳統廣東常見的沖正芪、長縱壓片黃芪，慢慢離開國內民眾的視野。特別中國內地對臨床用中藥品規規管日益嚴格，香港進口臨床用黃芪商品將會與香港中藥市場所出售的黃芪商品規格越行越遠，容易造成市場的混淆與混亂。

中藥不光是食材，更是防病治病的特殊商品，為適應中藥材商品在市場的流通，我國首於 1959 年頒佈了《38 種藥材商品規格標準》、1964 年頒佈了《54 種藥材商品規格標準》、及 1984 年頒佈了《76 種藥材商品規格標準》，一直沿用超過 30 年。中藥材的種植在這 30 年間較以往傳統種植出現較大的變化，以往流通的藥材多以野生品為主，逐漸向現代栽培品轉變；由於種植使用各種農藥及化肥，甚至將藥材引種至其他地域，使以往的標準已經無法適用於當代社會，亟待制定新的符合市場的規格等級標準。

有見及此，中國中醫科學院中藥資源中心(中藥材商品規格等級標準研究技術中心)牽頭，在中國科協首批團體標準試點專案支援下，根據中藥材商品規格等級劃分現狀及市場實際情況，制定了《中藥材商品規格等級通則》(SB/T 11173-2016)，並由我國商務部於 2016 年 9 月發布。該國內貿易行業標準包含了中藥材的商品規格等級術語和定義、規格等級劃分原則、劃分依據、劃分內容、合格性檢查等核心資訊，列舉出了常見規格和等級的劃分依據，並對其進行了定義說明。自 2018 年 12 月起，該中心主持制定的中藥商品規格等級團體標準(T/CACM1021.X-2018)陸續出台，並由中華中醫藥學會發布，至今共涵蓋 226 種中藥材。該團體標準的頒佈對規範藥材市場，保障藥品品質和臨床藥效，促進中藥材商品的流通和發展提供基礎。

隨着中藥出口量的不斷增長，技術性貿易壁壘已經成為中藥出口的最大障礙，中藥材商品規格等級標準的缺失使得中藥材交易規範化困難，不利於中藥材國際貿易的開展。因此，中國中醫科學院院長黃璐琦院士，帶領團隊於 2015 年向國際標準化組織中醫藥技術委員會(ISO/TC249)提出了《中醫藥 - 中藥材商品規格等級通則》標準提案，並於 2019 年成為首個於中藥領域獲發布的框架性標準通則，通則主要規定了中藥材商品規格等級劃分的原則、依據和要求等，適用於國際貿易中單個藥材商品規格等級標準的制定，對指導單個藥材建立規格等級標準，規範中藥

材國際市場流通秩序具有重要意義。

本協會為響應國家「十四五」中醫藥發展規劃中，對推動中藥商品的規範化和標準化的指導倡議，通過香港特區政府專業服務協進支援計劃的支援，印制《中藥材商品規格小冊子》，向香港中醫藥同業推廣中藥商品規格，提升相關認知。為積極融合國家發展大局，共同為中藥發展出力，香港宜加強中藥商品的國際認證和標準對接，推動中藥商品出口。

因此，本小冊子將列出 26 種具商品規格等級團體標準（T/CACM1021.X-2018）的中藥材商品，以作拋磚引玉之效，讀者可根據需要自行參考其他中藥商品規格等級的團體標準，進一步了解其餘中藥商品在國內的規格及等級劃分。另外，小冊子亦附註標準以外藥材商品規格及香港常見藥材商品規格。在平衡傳統經驗與商品標準的發展，小冊子最後部分集中收載其他甚具香港特色的中藥商品規格，以供參考。

本小冊子引用上述的團體標準，其標準的規格是以大類規格進行劃分，而中藥市場的中藥商品遠比標準的劃分複雜，小冊子除重點以圖文方式展示中藥材商品的大類規格，並附註獨特的資訊，如道地產區（各種產區的西洋參）、切法（原支人參及人參片）、培植方法（野生及栽培品）等，涉及大小或重量（頭數）的等級分類主要以文字列表方式顯示。若有關藥材涉及香港常見的獨特商品規格或混淆商品，將會在該藥材的專論上附加補充圖片說明，以增加本小冊子的實用性。

中藥商品學是一門高深的學問，參考資料和訊息相對較少，內容不免會有錯漏，若業界同仁對本小冊子有任何意見，歡迎電郵或致函本會斧正。本協會冀望本小冊子作為推動標準化中藥商品規格的起點，帶動業界接力推廣，促進兩地中藥材產業的交流，助力全球中醫藥產業的健康發展。

香港中藥藥劑師協會

序言	3
與中藥相關的標準與規範的簡介	8
中藥材商品規格等級釋義	11

第一章 根、根莖及藤木類

人參	16
土茯苓	29
川貝母	32
山藥	37
天麻	42
太子參	47
玉竹	49
北沙參	52
百合	55
西洋參	59
黃芪	64
當歸	71
黨參	77

第二章 果實及種子類

化橘紅	82
赤小豆	84
芡實	86
枸杞子	88
陳皮	91
酸棗仁	93
蓮子	96
薏苡仁	99

第三章 全草及其他類

石斛	104
冬蟲夏草	108
茯苓	113
鐵皮石斛	118
靈芝	122

附錄

其他具香港特色的中藥材商品	128
常用中藥材傳統經驗通用鑒別術語	139

參考資料

與中藥相關的標準與規範的簡介

與中藥相關的標準與規範的簡介

國際層級	例子
<p>國際標準化組織 (ISO)</p> <ul style="list-style-type: none"> 國際標準是指國際標準化組織 (ISO)、國際電工委員會 (IEC) 和國際電信聯盟 (ITU) 所製定的標準，以及國際標準化組織確認並公佈的其他國際組織所制定的標準。 	<p>ISO / TC249:《中醫藥——中藥材商品規格等級通則》</p> <ul style="list-style-type: none"> 首個於中藥領域獲發佈的框架性標準通則，通則主要規定了中藥材商品規格等級劃分的原則、依據和要求等。 適用於國際貿易中單個藥材商品規格等級標準的制定，對指導單個藥材建立規格等級標準，規範中藥材國際市場流通秩序具有重要意義。
國家層級	例子
<p>國家標準</p> <p>國家標準是指對全國經濟、技術發展有重大意義而必須在全國範圍內統一的標準。國家標準在全國範圍內適用，其他各級標準不得與國家標準相抵觸。</p> <ul style="list-style-type: none"> 強制性國家標準 (GB) 是保障人體健康、人身、財產安全的標準及法律及行政法規規定強制執行的國家標準。 推薦性國家標準 (GB/T) 指生產、交換、使用等方面，透過經濟手段或市場調節，而自願採用的國家標準。這類標準任何單位都有權決定是否採用，違反這類標準，不承擔經濟或法律上的責任。但是，一經接受並採用，或各方商定同意納入經濟合約中，就成為各方必須共同遵守的技術依據，具有法律上的約束性。 	<p>《中國藥典》</p> <ul style="list-style-type: none"> 是國家藥品標準，是國家對藥品的品質標準和檢定方法所做的技術規定，是藥品生產、供應、使用及管理等部门共同遵循的法定依據，是醫學界、藥學界及至全國人民用藥的「法典」。 是在中國境內生產、銷售和使用藥品必須執行的標準。 飲片品質標準着重於飲片的檢查項目、指標、應用範圍做出規定。 <p>《部頒藥品標準》</p> <ul style="list-style-type: none"> 是對《中國藥典》中未收載的中藥品種或內容的補充，同屬國家標準，也是全國各相關單位必須遵照執行的法定藥品標準。 <p>《國家中藥飲片炮製規範》</p> <ul style="list-style-type: none"> 主要收載中藥飲片的炮製工藝，側重於飲片的炮製工藝進行規範與統一，體現在對飲片炮製加工過程的控制。 同樣是對《中國藥典》中未收載的中藥品種或內容的補充，收載的內容既各自獨立又互為補充，屬中藥飲片品質控制體系中的重要組成部分，為中藥飲片的國家法定標準，均為飲片企業制定生產製程技術的法定依據。
<ul style="list-style-type: none"> 指導性國家標準 (GB/Z) 指生產、交換、使用等方面，由組織 (企業) 自願採用的國家標準，不具強制性，也不具有法律上的約束性，只是相關方約定參照的技術依據。 	<p>《76 種藥材商品規格標準》</p> <ul style="list-style-type: none"> 於 1984 年由國家中醫藥管理局和衛生部聯合頒布的中藥材商品規格標準，依照質量的高低、好次對常用的 76 種中藥材進行商品規格等級劃分，規定其品別、規格、等級三個方面的標準。

<p>地方標準</p> <p>地方標準是指為滿足地方自然條件、風俗習慣等特殊技術要求，省級標準化行政主管部門和經其批准的設區的市級標準化行政主管部門在農業、工業、服務業以及社會事業等領域所制定的標準。地方標準由省、自治區、直轄市人民政府標準化行政主管部門編制計劃，組織草擬，統一審批、編號、發佈，並報國務院標準化行政主管部門和國務院有關行政主管部門備案。地方標準適用於本行政區域其地方標準的技術要求不得低於強制性國家標準的相關技術要求；在相應的國家標準或行業標準實施後，地方標準應自行廢止。</p>	<p>省級中藥材標準</p> <ul style="list-style-type: none"> • 收載的藥材多為國家藥品標準未收載的品種，以及各省、自治區、直轄市的區域性習用品種。 • 各省（自治區、直轄市）的藥品生產、供應、使用、檢驗和管理部門必須遵照執行該省的中藥材標準，而此標準對其他區域的藥品則無法定約束力，但可作為參照執行的標準。 <p>省級中藥飲片炮製規範</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是國家藥品標準中未收載的地方臨床習用飲片品規和炮製方法的補充，是地方飲片加工、生產、經營、使用、檢驗、監督管理的法定依據。
--	---

官方層級	例子
<p>香港特別行政區自行制定的官方建議標準</p> <p>香港特別行政區基本法訂明了中醫藥未來發展的政策。基本法第 138 條列明「香港特別行政區政府自行制定發展中西醫藥和促進醫療衛生服務的政策。社會團體和私人可依法提供各種醫療衛生服務。」</p>	<p>《香港中藥材標準》（第一至十冊）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 由衛生署在 2001 年開展「香港中藥材標準」（「港標」）計劃統籌編寫，目的為一些香港常用中藥材制訂安全性及品質方面的建議標準。 • 涵蓋範圍超過 330 種中藥材，主要包括一些本地常用、具較高經濟價值、在安全和品質方面備受國際關注的中藥材，並以列於《中醫藥條例》（香港法例第 549 章）附表 1 及附表 2 的中藥材為優先。

業界層級	例子
<p>行業標準 (SB)</p> <p>行業標準是對沒有國家標準而又需要在全國某個行業範圍內統一的技術要求所制定的標準。業界標準不得與有關國家標準相抵觸。有關行業標準之間應保持協調、統一，不得重複。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SB/T 11173-2016《中藥材商品規格等級通則》 • SB/T 11174.1-2016《中藥材商品規格等級 第 1 部分：白朮》 • SB/T 11174.2-2016《中藥材商品規格等級 第 2 部分：太子參》
<p>團體標準 (T/-)</p> <p>團體標準是依法成立的社會團體為滿足市場和創新需求，協調相關市場主體共同訂定的標準。</p>	<p>中華中醫藥學會編著</p> <ul style="list-style-type: none"> • T/CACM 1362-2021《中藥飲片臨床應用規範》 • T/CACM 1361-2021《中藥飲片處方用名規範》 • T/CACM 1364-2021《中藥飲片處方應付規範》 • T/CACM 1365-2021《中藥飲片包裝規範》 • T/CACM 1021.X-2018《中藥材商品規格等級》 <p>中國中藥協會編著</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZGZYXH/T 10-2105《道地藥材標準通則》 • ZGZYXH/T 1-2015《中藥學基本術語》 • ZGZYXH/T 2-9-2015《藥用植物資源調查技術規範》

中藥材商品規格等級釋義

<p>規格</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 中藥材流通過程中交易品類的稱謂。 • 用於區分不同交易品類的依據。 • 一般是中藥材屬性的非連續性特徵。
<p>等級</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在一個規格下，用來區分中藥材品質的交易品類稱謂。 • 一般是中藥材屬性的連續性指標。
<p>道地藥材</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 經過中醫臨床長期應用優選出來的，產在特定地域，與其他地區所產同種中藥材相比，品質和療效更好，且質量穩定，具有較高知名度的中藥材。
<p>基源</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 應用植物、動物或礦物的形態學和分類學知識，對中藥材的來源進行準確鑒定，並確定其正確的動植物學名、礦物名稱。
<p>規格等級劃分原則</p>	<p>基於藥典原則</p> <ul style="list-style-type: none"> • 進行規格等級劃分的中藥材應符合《中華人民共和國藥典》相關規定。 <p>基於市場原則</p> <ul style="list-style-type: none"> • 根據目前中藥材流通環節商品的實際情況，在安全有效的基礎上進行合理的規格等級劃分，鼓勵採用質量為導向的規格等級劃分，以引導優質優價；非質量相關的規格等級根據產地加工及交易所需進行劃分，但適當淡化等級觀。 <p>基於簡便實用原則</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在指標性成分難以全面準確反映藥材質量，內在成分與傳統性狀劃分之間規律尚不明確的情況下，採用市場便於掌握及使用的性狀鑒別等簡單、方便、實用的方法進行規格等級的劃分，但必要時可採用現代分析儀器等組織、分子、理化指標進行限定。
<p>規格等級劃分基本要求</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 因廣泛栽培所致不同產地藥材質量變化較大的情況下，有道地產區的藥材，在規格欄下可單獨設道地藥材規格； • 根據藥材品質差異進行詳細規格等級劃分；規格或等級劃分無品質差異或尚無規律的則根據產地加工及交易所需情況予以劃分； • 既有規格又有等級的藥材，先劃分規格，在規格項下劃分等級；只有規格或等級的直接列出，並以列表形式給出； • 規格等級各項下詳細描述性狀鑒別特徵及限定要求等，以圖表形式列出劃分依據； • 在劃分表下對當前市場存在的其他情況，如習用品、混淆品、偽品、劣品等進行備註提示說明。

規格等級劃分依據	根據中藥材屬性的非連續性特徵，按基源、產地、栽培方式、藥用部位、採收時間、加工方法等對不同交易品類進行規格劃分。	
	來源	<p>根據不同動植（礦）物來源劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 鬱金（黃絲鬱金：為薑黃的塊根；溫鬱金：為溫鬱金的塊根；桂鬱金：為廣西莪朮的塊根）； 大黃（雅黃、南大黃：為藥用大黃的根及根莖；西大黃：為掌葉大黃或唐古特大黃的根及根莖）等。
	產地	<p>根據同一基源的動植（礦）物而產地不同進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 浙白朮、亳白朮； 川麥冬、浙麥冬； 川丹參、山東丹參等。
	栽培	<p>根據不同的種養殖模式進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 野生與栽培； 種子繁殖與無性繁殖等。
	藥用部位	<p>根據植物不同部位入藥而進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 三七剪口、筋條； 當歸身、當歸尾等。
	採收時間	<p>根據中藥材不同採收時間進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 青翹、老翹； 冬七、春七等。
	加工方法	<p>根據中藥材不同的產地加工方法進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 烘、曬、蒸、切等。
	外觀特徵	<p>根據藥材外觀特徵進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 色澤、紋理、皮孔、皺褶等。
	斷面特徵	<p>根據中藥材斷面特性進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 粉性、纖維性、裂隙等。

規格等級劃分依據	質地	<p>根據中藥材質地不同進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 疏鬆、角質、緊實等。
	質量	<p>根據中藥材質量劃分，多以每公斤或每市斤（即 500g）所含的個數，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 頭、支、個、粒等。
	長度	<p>根據中藥材長度劃分，多用於長條狀中藥材。</p>
	厚度	<p>根據中藥材厚度進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 黃柏、杜仲、肉桂、厚朴等皮類中藥材按厚度分成不同的等級。
	直徑	<p>根據中藥材直徑進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 圓球形中藥材的直徑大小； • 圓柱形中藥材的橫斷面直徑。
	含雜率	<p>根據中藥材含非藥用部位的量進行劃分，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 五味子的乾篇率； • 金銀花中的莖葉含率。
	氣味	<p>根據中藥材特異性氣味的程度進行劃分。</p>

第一章 根及根莖類

人參

來源：本品為五加科植物人參 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的乾燥根和根莖。

產地：中國吉林、遼寧、黑龍江等地所產的，俗稱「國產參」；朝鮮和韓國所產的，俗稱「高麗參」、「別直參」。

商品規格劃分：1. 生曬野山參、2. 生曬移山參、3. 全鬚長脖生曬參、4. 全鬚邊條生曬參、5. 全鬚普通生曬參、6. 邊條生曬參、7. 普通生曬參。

要求：不走油、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：

- 野生人參：完全在野生環境中自然傳播、發芽生長的原生態人參
- 野山參 / 林下參 / 林下山參 (林下籽 / 籽貨 / 籽海 / 籽上山 / 海貨)：人為把園參的種子播種後，沒有人為干預，任其自然生長於深山密林 15 年以上的人參
- 移山參 (山移)：山農放山時發現野生人參，由於重量和參齡小，不宜作貨，於是集中所獲移栽到居家附近的山野林下，便於看守，令其自然生長
- 移山參 (家移) / 山趴 / 林下趴 / 充山參：參農將園植的人參幼苗移植到山野林下，沒有人為因素干擾，使其在野生環境下自然生長
- 籽趴：野生人參的種子栽培在參園中，沒有人為因素干擾生長直到收穫為止
- 池趴：人工培育的參苗移栽到林下的池床中，沒有人為因素干擾生長
- 園趴：園參正常栽培後再移栽到另一個參床生長，以獲取更大的人參前後栽培超過 10 年以上
- 池底參：老參地或園參舊栽培地採挖後，遺漏下來的人參。遺漏在池底的園參，稱大池底；掉落在池底的參籽發芽所生者，稱小池底。
- 白參 / 白乾參：生曬參的別稱
- 白糖參 / 糖參：以漿氣¹不足、體形欠佳、不適於加工紅參的鮮人參為原料，以扎孔、浸糖等炮製加工而成

¹ 根據業內人士所指，漿氣指人參主根的香氣與飽滿程度，泛指其汁液和精華含量。

術語	定義
園參	人工栽培的人參
• 長脖園參 (石柱參)	生長 12 年以上，根莖長，主體小而靈，兩支根自然分叉，鬚根長而少的人參，俗稱「寬甸路」
• 邊條園參 (邊條參)	根莖較長，主體長，支根長的人參，俗稱「集安路」
• 普通園參 (普通參)	根莖短，主體短粗，支根多呈叢狀，不定根多的人參，俗稱「撫松路」
生曬參	以鮮園參為原料刷洗除鬚後，曬乾或烘乾而成的產品
• 邊條生曬參	以鮮邊條園參為原料刷洗除鬚後，曬乾或烘乾而成的產品
• 普通生曬參	以鮮普通園參為原料刷洗除鬚後，曬乾或烘乾而成的產品
全鬚生曬參	蘆、體、鬚完整的生曬參產品
• 全鬚長脖生曬參	以鮮長脖園參為原料刷洗後，曬乾或烘乾而成的產品
• 全鬚邊條生曬參	以鮮邊條園參為原料刷洗後，曬乾或烘乾而成的產品
• 全鬚普通生曬參	以鮮普通園參為原料刷洗後，曬乾或烘乾而成的產品
蘆	主根上部的根莖
• 蘆碗	每年地上莖脫落後遺留在蘆上的殘痕
• 圓蘆	與主根相連呈圓柱形，上有疙瘩狀蘆碗殘痕的一段蘆
• 堆花蘆	圓蘆上部蘆碗密集，狀如堆花的一段蘆
• 馬牙蘆	堆花蘆上部蘆碗緊密，狀如馬牙的一段蘆
• 二節蘆	具有圓蘆和馬牙蘆的蘆
• 三節蘆	具有圓蘆、堆花蘆、馬牙蘆的蘆
• 縮脖蘆	因生長條件限制蘆較短的蘆
• 長脖蘆	<ul style="list-style-type: none"> • 根莖細長，蘆碗緊密，排列有序的蘆 - 竹節蘆：形如竹節的蘆 - 線蘆：根莖細長如線的蘆 - 草蘆：馬牙蘆碗，大而排列有序的蘆 - 圓膀圓蘆：主根圓膀，與圓蘆相連的蘆

芋	生長於蘆上的不定根
• 棗核芋	兩端細、中間粗，形如棗核狀的芋
• 順長芋	上粗下細較長的芋
• 毛毛芋	較細的芋
• 蒜瓣芋	形如蒜瓣的芋
• 芋變	主根消失，芋繼續生長代替主根
體	人參的主根，即肩頭到較大支根的部分
• 靈體	兩條腿分襠自然，靈活的體
• 疙瘩體	主根粗短，形如疙瘩狀的體
• 順體	主根順長
• 笨體	主根形狀不靈活，腿有兩條以上
• 過梁體	主根分岔角度較大，形如山梁
• 橫體	主根橫向生長
紋	在主根上形成的環狀紋理
• 緊皮細紋	皮質細膩，肩部環紋清晰緊密
• 環紋	在主體上一圈一圈的環狀紋
• 跑紋	肩部的環紋延伸到主體下部
• 斷紋	環紋不連續或不完整
主根	人參根的主體部分
• 主根長	人參肩部到支根上部的長度
• 支根（腿）	生長於人參主根下端較粗的分根
• 鬚根（鬚）	生長在人參主根、支根上的根
珍珠點	鬚根上吸收根脫落形成的疣狀凸起
抽溝	因漿氣不足或跑漿而導致乾貨表面不平整的現象
疤痕	因病、蟲、鼠害及機械損傷和人為損傷等原因留下的痕跡
紅皮	人參表皮呈現紅褐色鏽斑
綁尾	用白線將人參支根纏繞固定
鐵線紋	主根上端外皮呈深色緊密的環紋，為野山參的鑒別要點之一
泡體	體形鬆泡如同海綿

規格等級劃分：

規格		單支重 /g	支數 /(支/500g)	主根長 /cm	
生曬野山參	特級	單支重 ≥ 15	/	/	
	一級	$12 \leq$ 單支重 < 15	/	/	
	二級	$9 \leq$ 單支重 < 12	/	/	
	三級	$7 \leq$ 單支重 < 9	/	/	
	四級	$5 \leq$ 單支重 < 7	/	/	
	五級	$3 \leq$ 單支重 < 5	/	/	
	六級	$1.3 \leq$ 單支重 < 3	/	/	
生曬移山參	一級	單支重 ≥ 25	/	/	
	二級	$20 \leq$ 單支重 < 25	/	/	
	三級	$15 \leq$ 單支重 < 20	/	/	
	四級	$10 \leq$ 單支重 < 15	/	/	
	五級	$5 \leq$ 單支重 < 10	/	/	
	六級	$2.5 \leq$ 單支重 < 5	/	/	
	七級	單支重 < 2.5	/	/	
圓參	全鬚長脖 生曬參	一級	$12 \leq$ 單支重 < 15	/	/
		二級	$9 \leq$ 單支重 < 12	/	/
		三級	$7 \leq$ 單支重 < 9	/	/
		四級	$5 \leq$ 單支重 < 7	/	/
		五級	$3 \leq$ 單支重 < 5	/	/
		六級	$1.5 \leq$ 單支重 < 3	/	/
	全鬚邊條生 曬參	10 支	≥ 50.0	≤ 10	≥ 10
		15 支	≥ 33.3	≤ 14	≥ 9
		20 支	≥ 25.0	≤ 20	≥ 8
		30 支	≥ 16.7	≤ 30	≥ 7

圓 參	全鬚邊條 生曬參	40 支	≥ 12.5	≤ 40	≥ 7
		50 支	≥ 10.0	≤ 50	≥ 7
		60 支	≥ 8.3	≤ 60	≥ 7
		80 支	≥ 6.2	≤ 80	≥ 7
	全鬚普通 生曬參	10 支	≥ 50.0	≤ 10	/
		15 支	≥ 33.3	≤ 15	/
		20 支	≥ 25.0	≤ 20	/
		25 支	≥ 20.0	≤ 25	/
		30 支	≥ 16.7	≤ 30	/
		40 支	≥ 12.5	≤ 40	/
		50 支	≥ 10.0	≤ 50	/
		60 支	≥ 8.3	≤ 60	/
		80 支	≥ 6.2	≤ 80	/
		100 支	≥ 5.0	≤ 100	/
	邊條 生曬參	10 支	≥ 50.0	≤ 10	≥ 10
		15 支	≥ 33.3	≤ 15	≥ 9
		20 支	≥ 25.0	≤ 20	≥ 8
		30 支	≥ 16.7	≤ 30	≥ 7
		35 支	≥ 14.3	≤ 35	≥ 7
		40 支	≥ 12.5	≤ 35	≥ 7
		60 支	≥ 8.3	≤ 60	≥ 7
		80 支	≥ 6.2	≤ 80	≥ 7
	普通 生曬參	10 支	≥ 50.0	≤ 10	/
		15 支	≥ 33.3	≤ 15	/
		20 支	≥ 25.0	≤ 20	/
		25 支	≥ 20.0	≤ 25	/
		30 支	≥ 16.7	≤ 30	/
		40 支	≥ 12.5	≤ 40	/
		50 支	≥ 10.0	≤ 50	/
		60 支	≥ 8.3	≤ 60	/

外觀等級劃分：

規格	項目	性狀特徵		
		特等	一等	二等
生曬野山參	蘆	三節蘆，蘆碗緊密、蘆較長，個別雙蘆或三蘆以上	兩節蘆或三節蘆，蘆碗較大、緊密，個別三蘆以上	二節蘆、縮脖蘆，蘆碗較粗大、蘆碗排列扭曲，有殘缺、疤痕、紅皮
	芋	棗核芋，芋重量不得超過主體 50%，不抽溝，色正有光澤	棗核芋，蒜瓣芋、毛毛芋或順長芋，芋重量不得超過主體 50%，不抽溝，色正有光澤	芋大或無芋，有殘缺、疤痕、紅皮
	體	靈體、疙瘩體，色正有光澤，黃褐色或淡黃白色，腿分襠自然，不抽溝，無疤痕，不泡體	順體、過梁體，色正有光澤，黃褐色或淡黃白色，腿分襠自然，不抽溝，不泡體	順體、笨體、橫體，黃褐色或淡黃白色，皮較鬆，抽溝，體小、芋變，有疤痕、紅皮
	紋	主體上部環紋細而深，緊皮細紋	主體上部環紋明顯	主體上部的環紋不全，斷紋或紋路較少
	鬚	細而長，疏而不亂，有珍珠點，主鬚完整，芋鬚下伸	細而長，疏而不亂，主鬚完整，芋鬚下伸	細而長，有傷殘及紅皮
生曬移山參	蘆	蘆長，兩節蘆或三節蘆，蘆碗較大	兩節蘆或竹節蘆，蘆碗較大	兩節蘆、竹節蘆或縮脖蘆，蘆碗較小
	芋	芋重量不得超過主體 50%，無疤痕、紅皮	芋重量不得超過主體 50%，無紅皮	芋大，有傷殘、紅皮
	體	靈體、疙瘩體，淡黃白色，有光澤，腿分襠自然，不抽溝，無疤痕、紅皮	順體、過梁體或笨體，有光澤，不抽溝，無疤痕、紅皮	芋變或沒芋，有傷殘、紅皮
	紋	環紋明顯	環紋粗而淺，或斷紋、跑紋	紋殘缺不全
	鬚	鬚長	較長，不清疏	較短，不清疏

全鬚長 膝生 曬參	蘆	線蘆或竹節蘆，碗間距小而緊密	圓膀圓蘆	草蘆或竹節蘆，碗間距大而稀疏，或蘆碗左右錯位
	芋	棗核芋，芋重不得超過主體 50%，不抽溝，色正有光澤	棗核芋或順長芋，芋重不得超過主體 50%，不抽溝，色正有光澤	順長芋，芋重不得超過主體 50%，不抽溝，色正有光澤
	體	主根較短，呈圓柱形或紡錘形；支根二條，根上部呈「人」字形自然分叉；根形舒展，橫靈體圓		主根較短，呈圓柱形或紡錘形
	紋	主體上部環紋明顯	環紋粗而淺	環紋粗而淺或斷紋、跑紋
	鬚	參鬚略少，鬚根長，清疏，生有多數疣狀突起	參鬚略少，鬚根長，清疏	
	表皮	黃褐色，無紅皮，不抽溝		
	斷面	黃白色，粉性，樹脂道明顯		
	質地	較硬，有粉性，無空心		
氣味	香氣特異，味微苦、甘			
全鬚邊 條生 曬參	主根	呈圓柱形		
	支根	有明顯支根 2-3 條且粗細較均		分支 1-4 個，粗細不均
	蘆鬚	蘆頭和鬚根齊全	蘆頭和鬚根較齊全	蘆頭和鬚根殘缺
	表面	黃白色或灰黃色，無紅皮，無抽溝	黃白色或灰黃色，輕度紅皮、抽溝	黃白色或灰黃色，明顯紅皮、抽溝
	斷面	斷面淡黃白色，呈粉性，樹脂道明顯		
	質地	較硬、有粉性、無空心		
	氣味	香氣特異，味微苦、甘		
	破損、疤痕	無	輕度	明顯
蟲蛀、霉變、雜質	無			


第一章 根及根莖類

全鬚普通生曬參	主根	呈紡錘形或圓柱形		
	蘆鬚	蘆頭和鬚根齊全	蘆頭和鬚根較齊全	蘆頭和鬚根嚴重殘缺
	支根	不綁尾或輕綁尾、綁尾者不准夾小參或參鬚		
	表面	黃白色或灰黃色，無紅皮、抽溝	黃白色或灰黃色，輕度紅皮、抽溝	黃白色或灰黃色，明顯紅皮、抽溝
	斷面	斷面淡黃白色，呈粉性		
	質地	較硬、有粉性、無空心		
	氣味	香氣特異，味微苦、甘		
	破損、疤痕	無	輕度	明顯
	蟲蛀、霉變、雜質	無		
邊條生曬參	主根	呈圓柱形		
	表面	黃白色或灰黃色，無紅皮，無抽溝	黃白色或灰黃色，輕度紅皮、抽溝	黃白色或灰黃色，明顯紅皮、抽溝
	斷面	斷面淡黃白色，粉性，樹脂道明顯		
	質地	較硬、有粉性、無空心		
	氣味	香氣特異，味微苦、甘		
	破損、疤痕	無	輕度	明顯
	蟲蛀、霉變、雜質	無		
普通生曬參	主根	呈圓柱形		
	表面	黃白色或灰黃色，無紅皮，無抽溝	黃白色或灰黃色，輕度紅皮、抽溝	黃白色或灰黃色，明顯紅皮、抽溝
	斷面	斷面淡黃白色，呈粉性		
	質地	較硬、有粉性		
	氣味	香氣特異，味微苦、甘		
	破損、疤痕	無	輕度	明顯
	蟲蛀、霉變、雜質	無		

商品性狀特徵：

生曬野山參


- 蘆碗緊密，蘆較長，個別雙蘆或三蘆以上
- 表面黃褐色或淡黃白色，有光澤，主體上部環紋細而深（俗稱鐵線紋）
- 鬚根細而長，疏而不亂，有珍珠點



|| 生曬野山參 (30 至 35 年) ||

全鬚長脖生曬參

- 線蘆或竹節蘆，碗間距小而緊密
- 主根較短，呈圓柱形或紡錘形
- 支根二條，根上部呈「人」字形自然分叉
- 主體上部環紋明顯
- 參鬚略少，鬚根長，清疏，生有多數疣狀突起
- 表面黃褐色，斷面黃白色，呈粉性，樹脂道明顯
- 質地較硬，香氣特異，味微苦、甘



全鬚普通生曬參

- 主根呈紡錘狀或圓柱形
- 蘆頭和鬚根齊全，不綁尾或輕綁尾，綁尾者不准夾小參或參鬚
- 表面黃白色或灰黃色，無紅皮或輕度紅皮
- 斷面淡黃白色，呈粉性；質硬，無空心
- 香氣特異，味微苦、甘




|| 全鬚普通生曬參 ||

附：其他常見商品規格

野生人參（由天大集團供應並具鑑定證書）


- 性狀如生曬野山參特等項下。



|| 野生人參（40-50年）：【特等】 ||

人參片（由各類生曬參橫切而成）

- 切片呈圓形或類圓形薄片，斷面淡黃白色，呈粉性，質地較硬
- 形成層環紋棕黃色，皮部有黃棕色的點狀樹脂道；木部具放射狀裂縫



|| 生曬參：橫切 ||


鮮人參

- 蘆頭短而粗，有時可見殘留的部分草質莖
- 主根為粗壯的圓柱形，表面黃白色，光滑，鐵線紋不明顯
- 較粗的支根有 2-3 條，支根上長有較細的鬚根，質地柔嫩而易折斷
- 富含水分，較重，參香明顯，味微苦、甘

主根粗壯，鐵線紋不明顯

支根較粗

鬚根質地柔嫩而易折斷



蘆頭短而粗，可見
殘留的部分草質莖

|| 普通圓參：鮮製 ||

土茯苓

來源：本品為百合科植物光葉菝葜 *Smilax glabra* Roxb. 的乾燥根莖。夏、秋二季採挖，除去鬚根，洗淨，乾燥；或趁鮮切成薄片，乾燥。

產地：廣東、浙江、湖南、湖北等地。目前市場土茯苓多為產於越南等周邊國家的進口土茯苓，國產土茯苓因資源以及採挖成本等原因而相對較少。

商品規格劃分：1. 選貨、2. 統貨。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。


常見商品名稱：原色土茯苓、齊土茯苓、鮮土茯苓、紅土苓。

規格	性狀特徵	
	共同點	區別點
選貨	乾貨。呈不規則的片，邊緣不整齊。切面黃白色或紅褐色，粉性，可見點狀維管束及多數小亮點，水濕潤後有黏滑感。氣微，味微甘、澀。無雜質、蟲蛀、霉變	依需求大小分檔，或篩去小於 1cm 左右的藥屑、小片
統貨		大小不一，未去除藥屑、碎片

商品性狀特徵：

土茯苓選貨

- 呈不規則的片，邊緣不整齊
- 切面類白色至淡紅棕色，粉性，可見點狀維管束及多數小亮點
- 以水濕潤後有黏滑感
- 氣微，味微甘、澀



|| 土茯苓選貨：縱切厚片 ||

附：其他常見商品規格

鮮土茯苓

- 不規則塊狀，略呈扁圓柱形而彎曲不直，多分枝，有結節狀隆起
- 表皮紅棕色或棕褐色，粗糙，常有刀傷切口及側根殘餘部分，上端具莖痕
- 質堅硬，不易折斷；斷面粗糙，淡棕色，有粉性
- 氣微，味甘淡



|| 土茯苓統貨(個)：鮮製 ||

附：香港特色商品規格

土茯苓齊手片

- 由多層土茯苓薄片疊加齊整，修邊，並用宣紙扎成捆
- 薄片呈橢圓或不規則塊狀
- 其餘特徵與土茯苓選貨一致



|| 土茯苓選貨：縱切薄片，齊手 ||

附：香港常見混淆商品

菝葜(金剛頭)為百合科植物菝葜 *Smilax china* L. 的乾燥根莖。

- 呈不規則的片
- 外表皮黃褐色或紫褐色，可見殘留刺狀鬚根殘基或細根
- 切面棕黃色或紅棕色，纖維性，可見點狀維管束
- 質硬，折斷時有粉塵飛揚
- 氣微，味微苦、澀



肖菝葜(白土苓)為百合科植物肖菝葜 *Heterosmilax japonica* Kmeth. 的乾燥根莖。

- 呈不規則的片
- 外皮凹凸不平，灰褐色，已剝落部份呈黃褐色，可見裂隙
- 切面白色、淡棕色或淡黃色
- 質地致密，略顯粉性
- 氣微，味淡



|| 肖菝葜：縱切薄片，齊手 ||

川貝母

來源：本品為百合科植物川貝母 *Fritillaria cirrhosa* D. Don、暗紫貝母 *F. unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia、甘肅貝母 *F. przewalskii* Maxim.、梭砂貝母 *F. delavayi* Franch.、太白貝母 *F. taipaiensis*. P. Y. Li 或瓦布貝母 *F. unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia var. *wabuensis* (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu、S. Wang et S. C. Chen 的乾燥鱗莖。依性狀不同分別習稱「松貝」、「青貝」、「爐貝」和「栽培品」。

商品名	來源	特徵
松貝	一年生的川貝母、暗紫貝母和甘肅貝母的鱗莖*	懷中抱月、觀音坐蓮、縷衣黑篤（請參本章節的規格等級）
青貝	二年生的川貝母、暗紫貝母和甘肅貝母的鱗莖*	觀音合掌（請參本章節的規格等級）
爐貝	梭砂貝母	虎皮斑、馬牙嘴（請參本章節的規格等級）
栽培品	太白貝母、瓦布貝母	太白貝母：類扁球形或短圓柱形，2瓣大小相近 瓦布貝母：類扁球形或短圓柱形，2瓣大小相近，表面有淺黃色點

* 資料來源：中國中藥材及飲片真偽鑑別圖典

產地：四川、青海、西藏、雲南等地。

商品規格劃分：1. 松貝、2. 青貝、3. 爐貝。

要求：無蟲蛀、無霉變、無雜質。

常見商品名稱：川貝、爐貝、松貝、青貝、珍珠貝、小金川。

術語	定義
油粒	川貝母乾燥過程中堆積發熱引起的角質化，或手翻動等造成膜皮緊貼，水分揮發不暢而變深，統稱為油粒，多見於松貝、青貝，又稱「黃子」
開花粒	指松貝等級中混有的青貝，因頂部開裂故名開花粒
碎瓣	川貝母鱗莖脫落的完整或不完整的鱗片

第一章 根及根莖類

芯籽	青貝破碎而脫落的殘莖心芽
懷中抱月	松貝的外層鱗葉 2 瓣，大小懸殊，大瓣緊抱小瓣，未抱部分呈新月形
觀音坐蓮	松貝底部平、微凹入，平放能端正穩坐
縷衣黑篤	松貝藥材基部稍凹入，間見黑斑，留有根須痕
觀音合掌	青貝外層鱗葉 2 瓣，大小相近，相對抱合
虎皮斑	爐貝鱗葉表面所特有的黃白色或棕色斑點
馬牙嘴	爐貝藥材呈棱狀圓錐形和長卵圓形，形似馬牙狀，其頂端較瘦尖，均呈開口狀

外觀等級劃分：


規格		等級	性狀特徵		
			共同點	區別點	
松貝	選貨	一等	呈類圓錐形或近球形，高 0.3-0.8 cm，直徑 0.3-0.9 cm，表面類白色。外層鱗葉兩瓣、大小懸殊，大瓣緊抱小瓣，未抱部分呈新月形，習稱「懷中抱月」，頂端閉合，內有類圓柱形、頂端稍尖的心芽和小鱗葉 1-2 枚；先端鈍圓或稍尖，底部平，微凹入，中心有 1 灰褐色鱗莖盤，偶有殘存鬚根。表面白色，體結實，質細膩，斷面白色、富粉性。乾貨、無雜質、蟲蛀、霉變，氣微，味微苦	直徑 0.3-0.45cm	油粒 + 碎瓣 ≤5%
		二等		直徑 0.45-0.65cm	油粒 + 開花粒 + 碎瓣 ≤5%
		三等		直徑 0.65-0.9cm	油粒 + 開花粒 + 碎瓣 ≤10%
		四等		直徑 0.45-0.9cm	開花粒 ≤20%，油粒 + 碎瓣 ≤10%
		五等		直徑 0.65-0.9cm	開花粒 ≤20%，油粒 + 碎瓣 ≤10%
	統貨	/	大小不分	開花粒 ≤20%，油粒 + 碎瓣 ≤10%	
青貝	選貨	一等	(類扁球形，高 0.4-1.4cm，直徑 0.4-1.6cm，外層鱗葉兩瓣，大小相近，相對抱合，頂部開裂、內有心芽和小鱗葉及細圓柱形的殘莖。表面白色、細膩、體結。斷面粉白色。氣微，味微苦，乾貨、無雜質、蟲蛀、霉變)	直徑 ≤1.0cm	油粒 + 碎瓣 ≤20%， 芯籽重量佔比 ≤2%
		二等		直徑 >1.0cm	
	統貨	/	大小不分	油粒 + 碎瓣 ≤20%， 芯籽重量佔比 ≤5%	

爐貝	選貨	一等	(長圓錐形,高 0.7-2.5 cm, 底部直徑 0.5-2.5 cm, 表面類白色或淺棕黃色, 有的具棕色斑點, 外層鱗葉 2 瓣, 大小相近, 頂部開裂而略尖, 基部稍尖或較鈍, 氣微, 味微苦, 乾貨、無雜質、蟲蛀、霉變)	表面類白色	油粒 + 碎瓣 ≤20%
		二等		表面淺棕黃色, 有的具棕色斑點	
	統貨	/		表面類白色或淺棕黃色, 有的具棕色斑點	油粒 + 碎瓣 ≤20%

商品性狀特徵：

松貝

- 呈類圓錐形或近球形, 表面類白色
- 外層鱗葉 2 瓣, 大小懸殊, 大瓣緊抱小瓣, 未抱部分呈新月形
- 頂端閉合, 內有類圓柱形、頂端稍尖的心芽及小鱗葉 1-2 枚
- 先端鈍圓或稍尖, 底部平, 微凹入, 中心有 1 灰褐色鱗莖盤, 偶有殘存鬚根
- 體結實, 質細膩; 斷面白色、富粉性
- 氣微, 味微苦



|| 松貝 (正面) ||



|| 松貝 (底面) ||

第一章 根及根莖類

青貝

- 呈類扁球形
- 外層鱗葉 2 瓣，大小相近，相對抱合
- 頂部開裂，內有心芽和小鱗葉及細圓柱形的殘莖
- 表面白色，體結實，質細膩。斷面粉白色
- 氣微，味微苦



|| 青貝 ||

爐貝

- 長圓錐形
- 表面類白色或淺棕黃色，有的具棕色斑點
- 外層鱗葉 2 瓣，大小相近，頂部開裂而略尖，基部稍尖或較鈍
- 氣微，味微苦




|| 爐貝 ||

附：香港常見混淆商品

平貝母 為百合科植物平貝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim. 的乾燥未成熟鱗莖。春季採挖，除去外皮、鬚根及泥沙，曬乾或低溫乾燥。主產黑龍江五常、尚志及吉林樺甸、撫松、安圖、臨江等地。


- 呈扁球形
- 表面黃白色至淺褐色，外層鱗葉 2 瓣，肥厚，大小相近或一片稍大抱合，頂端略平或微凹入，常稍開裂；中央鱗片小
- 質堅實而脆，斷面粉性
- 氣微，味苦



|| 平貝母 (未成熟鱗莖) ||

浙貝母 為百合科植物浙貝母 *Fritillaria thunbergii* Miq. 的乾燥鱗莖。浙貝母與川貝母功效相近，但價錢差距甚大，市場常以較便宜的浙貝母代替川貝母入藥。

- 原粒為單瓣鱗片。一面凸出，一面凹入，呈元寶狀，習稱「元寶貝」
- 表面白色，或帶淡黃色，被有白色粉末
- 質硬而脆，易折斷，斷面不齊，白色或淡黃色，富粉性
- 氣微，味苦



|| 浙貝母 (元寶貝) : 厚片 ||

山藥

來源：本品為薯蕷科植物薯蕷 *Dioscorea opposita* Thunb. 的乾燥根莖。冬季莖葉枯萎後採挖，切去根頭，洗淨，除去外皮和鬚根，乾燥，習稱「毛山藥」；或除去外皮，趁鮮切厚片，乾燥，稱為「山藥片」；也有選擇肥大順直的乾燥山藥，置清水中，浸至無乾心，悶透，切齊兩端，用木板搓成圓柱狀，曬乾，打光，習稱「光山藥」。「山藥片」可分為「鮮切片」和「乾切片」兩種；「鮮切片」通常為「無硫烘乾片」；「乾切片」通常為「光山藥片」。

產地：河南、山西、河北、陝西等地。

商品規格劃分：1. 光山藥、2. 毛山藥、3. 山藥片（鮮切片和乾切片）、4. 毛山藥片統貨。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變。

常見商品名稱：淮山、淮山片、鐵棍淮山、山藥、乾淮山、生曬淮山、脫水淮山、鮮淮山等。

（註：香港出現的山藥商品，可能是藥典另一品種 - 黃山藥（薯蕷科植物黃山藥 *Dioscorea panthaica* Prain et Burk. 的根莖）。兩廣、福建等地種植的主要為以食用為主的山藥，各地規範中收載的藥用山藥為褐苞薯蕷、參薯或山薯）。

術語	定義
炸頭	光山藥產地加工過程中產生的部分光山藥兩端炸裂、張口
黃筋	山藥重茬種植時，病蟲害或熏不透引起的山藥纖維等變黃

外觀等級劃分：


規格		等級	性狀特徵		
			共同點	區別點	
光山藥		一等	乾貨。呈圓柱形，條均挺直，光滑圓潤，兩端平齊，可見明顯顆粒狀。切面白色或黃白色。質堅脆，粉性足。無裂痕、空心、炸頭。氣微，味淡，微酸	長 ≥15cm，直徑 ≥2.5cm	
		二等		長 ≥13cm，直徑 2.0-2.5cm	
		三等		長 ≥10cm，直徑 1.7-2.0cm	
		四等		長短不分，直徑 1.5-1.7cm，間有碎塊	
毛山藥		一等	乾貨。略呈圓柱形，彎曲稍扁，表面黃白色或淡黃色。有縱溝、縱皺紋及鬚根痕，偶有淺棕色外皮殘留。體重，質堅實，不易折斷，斷面白色，粉性。氣微，味淡、微酸，嚼之發黏	長 ≥15cm，中部圍粗 ≥10cm，無破裂、空心、黃筋	
		二等		長 ≥10cm，中部圍粗 6-10cm，無破裂、空心、黃筋	
		三等		長 ≥7cm，中部圍粗 3-6cm，間有碎塊，無破裂、空心、黃筋	
		四等		長短不分，直徑 ≥1.0cm，間有碎塊。少量破裂、空心、黃筋	
山藥片		一等	為不規則的厚片，皺縮不平，切面白色或黃白色，質堅脆，粉性。氣微，味淡	直徑 ≥2.5cm，均勻，碎片 ≤2%	
		二等		直徑 ≥1.0cm，均勻，碎片 ≤5%	
		一等		為斜切或圓切厚片，切面白色或黃白色，光滑，質堅脆，粉性。氣微，味淡、微酸	直徑 ≥1.5cm，均勻，碎片 ≤2%
		二等			直徑 ≥1.2cm，均勻，碎片 ≤5%
毛山藥統貨		/	為不規則的帶皮厚片，切面白色或黃白色，質堅脆，粉性。氣微，味淡、微酸。直徑大於 1.0cm 以上的片重佔比 ≥60%，碎片、灰末重量佔比 ≤4%		

商品性狀特徵：

山藥片（乾切片）


- 斜切或圓切厚片，切面白色或黃白色
- 表面光滑，質堅脆，粉性
- 氣微，味淡、微酸

切面白色，表面
光滑而具粉性



|| 山藥片（乾切片）：斜切厚片（柳葉片） ||

表面白色，
光滑而具粉性



|| 山藥片（乾切片）：橫切厚片（圓片） ||

山藥片（鮮切片）

- 通常為鮮山藥未經硫磺熏製下，切片烘乾而成
- 不規則的厚片，皺縮不平
- 切面白色或黃白色，質堅脆，粉性
- 氣微，味淡



|| 山藥片（鮮切片）：無硫烘乾，橫切厚片 ||

附：其他常見商品規格

鮮山藥

- 呈長圓柱形，條均挺直
- 表皮棕褐色，有殘留鬚根，有暗紅色或紫色鐵鏽斑，質地堅實
- 斷面具黏性




|| 毛山藥統貨：鮮製 ||

第一章 根及根莖類

水燙 / 低硫山藥片 (用開水燙煮至無白心)

- 長橢圓形或柳葉形，形狀稍為捲曲
- 色淡黃白，切面光滑，蠟樣狀，白色筋脈明顯
- 觸感堅韌，不易折斷，粉性不明顯
- 氣微，味淡



|| 山藥片 (乾切片) : 斜切厚片, 水燙 ||

天麻

來源：本品為蘭科植物天麻 *Gastrodia elata* Bl. 的乾燥塊莖。立冬後至隔年清明前採挖，立即洗淨，蒸透，敞開低溫乾燥。天麻藥材現為栽培品，野生品已經形成不了大宗商品。

產地：主產於四川、雲南、貴州、陝西、湖北等地。

商品規格劃分：1. 烏天麻（冬麻、春麻）、2. 紅天麻（冬麻、春麻） [冬麻為市場主流商品，春麻商品流通量較少]

要求：無變色、不走油、無蟲蛀、無霉變、無雜質。

常見商品名稱：

- 川天麻：雲南昭通和迪慶，貴州畢節，四川宜賓、瀘州等地區所產的烏天麻
- 什路天麻：湖北恩施地區鹹豐、鶴峰、巴東所產的紅天麻
- 西天麻 / 漢中天麻：陝西漢中、甘肅文縣、河南南陽等西北地方所產的紅天麻

術語	定義
紅天麻	蘭科植物天麻（原變型紅天麻）的乾燥塊莖。塊莖較大，粗壯，長圓柱形或啞鈴形；花莖橙紅色，花黃色而略帶橙紅色。主要產於長江及黃河流域海拔 500-1500m 的山區，遍及西南至東北大部分地區。目前我國大部分地區栽培者多為此變型
烏天麻	蘭科植物天麻（烏天麻變型）的乾燥塊莖。塊莖短粗，呈橢圓形至卵狀橢圓形，節較密；花莖灰棕色，帶白色縱條紋，花藍綠色。主要產於貴州西部、雲南東北部至西北部的 1500m 以上高海拔分地區。天麻此變型塊莖折幹率特高，在雲南栽培的天麻多為此變型
冬麻	在立冬後至次年清明前，天麻花莖未抽臺出土，進行採收加工的天麻。此時地下塊莖內營養物質積累最多，質最好
春麻	清明過後，天麻花莖已抽臺出土，進行採收加工的天麻。此時地下塊莖的營養物質已部分消耗，質次之
潛伏芽	指天麻塊莖環節上鱗片腋內的芽。其在塊莖環節上呈現出隱約可見的白色斑點，習稱「芝麻點」
花莖芽殘留莖	天麻略尖一端，有時可見紅棕色至深棕色鸚嘴狀的芽或殘留莖基，其中鸚嘴狀的芽，習稱「鸚哥嘴」

營養繁殖莖 殘留基	白麻、米麻無性繁殖萌生出營養繁殖莖的殘留基，箭麻上的殘留基，習稱「肚臍眼」
支	單位重量內所含天麻藥材的個數

外觀等級劃分：

規格		等級	性狀特徵	
			共同點	區別點
烏天麻	冬麻	一等	橢圓形、卵形或寬卵形，略扁，且短、粗，肩寬、肥厚，俗稱「醬瓜」形；長 5-12cm，寬 2.5-6cm，厚 0.8-4cm。表面灰黃色或黃白色，縱皺紋細小。「芝麻點」多且大；環節紋深且粗，且環節較密，一般為 9-13 節。「鸚哥嘴」呈紅棕色或深棕色，較小。「肚臍眼」小巧，下凹明顯。體重，質堅實，難折斷，斷面平坦，黃白色，無白心、無空心，角質樣。氣微，味回甜，久嚼有黏性	每千克 16 支以內，無空心、枯炕
				每千克 25 支以內，無空心、枯炕
		二等		每千克 50 支以內，大小均勻，無枯炕
		三等		每千克 50 支以外，以及凡不合一、二、三等的碎塊、空心、破損天麻均屬此等
	四等			
	春麻	統貨	寬卵形、卵形，扁，且短，肩寬；長 5-12cm，寬 2.5-6cm，厚 0.8-4cm。多留有花莖殘留基，表皮縱皺紋粗大，外皮多未去淨，色灰褐，體輕，質鬆泡，易折斷，斷面常中空	

紅天麻	冬麻	一等	長圓柱形或長條形，略扁，稍彎曲，肩部窄，不厚實。長 6-15cm，寬 1.5-6cm，厚 0.5-2cm。表面灰黃色或淺棕色，縱皺紋細小。「芝麻點」小且少，環節紋淺且較細，且環節較稀而多，一般為 15-25 節。「鸚哥嘴」呈紅棕色，較肥大。「肚臍眼」較粗大，下凹不明顯。質堅硬，不易折斷，斷面較平坦，黃白色至淡棕色，角質樣，一般無空心。氣微苦，略甜	每千克 16 支以內，無空心、枯炕
		二等		每千克 25 支以內，無空心、枯炕
		三等		每千克 50 支以內，大小均勻，無枯炕
		四等		每千克 50 支以外，以及凡不合一、二、三等的碎塊、空心、破損天麻均屬此等
	春麻	統貨	長圓柱形或長條形，扁，彎曲皺縮，肩部窄，不厚實。長 6-15cm，寬 1.5-6cm，厚 0.5-2cm。多留有花莖殘留基，表皮縱皺紋粗大，外皮多未去淨，色黃褐色或灰褐色，體輕，質鬆泡，易折斷，斷面常中空	

《七十六種藥材商品規格標準》以野生天麻為標準（當時栽培品較少），按照商品天麻個頭大小和完整度，分為 26 支、46 支、90 支和 90 支外 4 個等級；現商品全部為栽培品，個頭大幅度提升，最大個體在 100g 左右，最小個體一般在 10g 左右；市場調研一等個頭在 60g 以上居多（約 16 支），二等在 40g 以上（約 25 支），三等在 20g 以上（約 50 支），四等在 10-20g；故將天麻等級標準提高，一等為 16 支、二等 25 支、三等 50 支、四等為 50 支以下。

商品性狀特徵：

烏天麻（冬麻）

- 橢圓形、卵形或寬卵形，略扁，且短、粗，肩寬、肥厚，俗稱「醬瓜形」
- 表面灰黃色或黃白色，縱皺紋細小
- 「芝麻點」多且大；環節紋深且粗，且環節較密，一般為 9-13 節
- 「鸚哥嘴」呈紅棕色或深棕色，較小
- 「肚臍眼」小巧，下凹明顯
- 體重，質堅實，難折斷，斷面平坦，黃白色



|| 烏天麻 (冬麻) ||

紅天麻（冬麻）

- 長圓柱形或長條形，略扁，稍彎曲，肩部窄，不厚實
- 表面灰黃色或淺棕色，縱皺紋細小
- 「芝麻點」小且少，環節紋淺且較細，且環節較稀而多
- 「鸚哥嘴」呈紅棕色，較肥大
- 「肚臍眼」較粗大，下凹不明顯
- 質堅硬，不易折斷，斷面較平坦，黃白色至淡棕色，角質樣





|| 紅天麻 (冬麻) ||

附：香港特色商品規格

天麻（齊手片）

- 由多層天麻薄片疊加，並用宣紙扎成捆
- 外表皮淡黃色至黃褐色，有時可見點狀排成的橫環紋
- 切面黃白色至淡褐色，角質樣，半透明



|| 天麻：縱切厚片，齊手 ||

太子參

來源：本品為石竹科植物孩兒參 *Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 的乾燥塊根。夏季莖葉大部分枯萎時採挖，洗淨，除去鬚根，置沸水中略燙後曬乾或直接曬乾。

產地：貴州、福建、山東、江蘇、安徽等地。

商品規格劃分：1. 選貨、2. 統貨。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：孩兒參、米參、童參。

術語	定義
上中部直徑	藥材塊根全長中部的上折半處（約為全長四分之一處），最粗部位的直徑
單個重量	單個太子參藥材塊根的品質
50g 塊根數	每 50g 太子參藥材塊根中塊根的個數

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
選貨	一等	乾貨。長紡錘形，較短，直立。表面黃白色，少有縱皺紋。飽滿，凹陷處有鬚根痕。質硬，斷面平坦，淡黃白色或類白色。氣微，味微甘。無鬚根	個體較短，上中部直徑 ≥ 0.4 cm，單一重量 ≥ 0.4 g，每 50g 塊根數 ≤ 130 個，個頭均勻
	二等		個體較長，上中部直徑 ≥ 0.3 cm，單一重量 ≥ 0.2 g，每 50g 塊根數 ≤ 250 個，個頭均勻
統貨	/	乾貨。細長紡錘形或長條形，彎曲明顯。表面黃白色或棕黃色，縱皺紋明顯，凹陷處有鬚根痕。質硬，斷面平坦，淡黃白色或類白色。氣微，味微甘。上中部直徑 < 0.3 cm，單一重量 < 0.2 g，每 50g 塊根數 > 250 個。有鬚根，長短不均一	

* 市場上貴州、安徽、山東、福建等地的太子參外觀稍有差異，但各產區均以個體大小、均勻度、顏色等進行等級劃分。而當前市場太子參藥材存在產地混雜情況。

商品性狀特徵：

太子參選貨

- 呈長紡錘形，較短，多直立
- 表面呈黃白色或棕黃色，凹陷處有鬚根痕，少有縱皺紋，飽滿，無鬚根
- 質硬，斷面平坦，淡黃白色或類白色
- 氣微，味微甘




|| 太子參選貨 ||

附：其他常見商品規格

硫熏太子參

- 如太子參性狀特徵
- 表面呈淡黃白色，表面縱皺紋和鬚根痕不明顯
- 或具濃烈且刺鼻的酸味



|| 太子參選貨：硫熏 ||

玉竹

來源:本品為百合科植物玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 的乾燥根莖。
秋季採挖，除去鬚根，洗淨，曬至柔軟後，反覆揉搓、晾曬至無硬心，曬乾；
或蒸透後，揉至半透明，曬乾。

產地:湖南、河南、浙江、江蘇等地。

商品規格劃分:1. 選貨、2. 統貨。

要求:無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱:

- 玉竹別名或商品別稱：萎蕤、葳蕤、玉參、尾參
- 野生品：關玉竹（東北）、江北玉竹（江蘇、安徽）
- 栽培品：湘玉竹（湖南邵東邵陽）、廣玉竹（兩廣）、海門玉竹（江蘇海門、南通）、東玉竹（浙江新昌、江蘇）、西玉竹（廣東連州）

術語	定義
長度	單個玉竹藥材的長度
直徑	單個玉竹藥材塊根中部的直徑

外觀等級劃分:

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
選貨	一等	長圓柱形，略扁。表面黃白色或淡黃棕色，半透明，具縱皺紋和微隆起的環節，有白色圓點狀的鬚根痕和圓盤狀莖痕。質硬而脆或稍軟，易折斷，斷面角質樣或顯顆粒性。氣微，味甘，嚼之發黏	長度 $\geq 14\text{cm}$ ， 直徑 $\geq 1.2\text{cm}$
	二等		長度 $\geq 9\text{cm}$ ， 直徑 $\geq 0.9\text{cm}$
統貨	/	圓柱形或略扁。表面黃白色或淡黃棕色，有縱皺紋和微隆起的環節，有白色圓點狀的鬚根痕和圓盤狀莖痕。質硬而脆或稍軟，易折斷，斷面角質樣或顯顆粒性。氣微，味甘，嚼之發黏。長度 $\geq 4\text{cm}$ ，直徑 $\geq 0.5\text{cm}$ 。長短、直徑不均一	

商品性狀特徵：

玉竹選貨

- 呈長圓柱形，略扁
- 表面黃白色或淡黃棕色，具明顯的縱皺紋和微隆起的環節，有白色圓點狀鬚根痕和圓盤狀莖痕
- 質硬脆或稍軟
- 氣微，味甘，嚼之發黏




|| 玉竹選貨 ||


附：其他常見商品規格

玉竹片

- 外表黃白色至淡黃棕色，半透明，有時可見環節
- 切面角質樣，具顯顆粒性
- 氣微，味甘，嚼之發黏



|| 玉竹(廣玉竹):長縱切片 ||




|| 玉竹（湘玉竹）：長縱切片 ||

附：香港常見混淆商品

海玉竹（玉竹頭） 為百合科植物滇黃精 *Polygonatum kingianum* Coll. et Hemsl.、黃精 *P. sibiricum* Red. 或多花黃精 *P. cyrtonea* Hua 的乾燥根莖。依形狀不同，習稱「大黃精」、「雞頭黃精」、「薑形黃精」。春、秋二季採挖，除去鬚根，洗淨，放入沸水中略燙或蒸至透心，乾燥。（註：市面上的玉竹頭亦有可能為百合科植物熱河黃精 *Polygonatum macropodium* Turcz. 的乾燥根莖）。

- 呈扁平不規則片狀
- 外皮黃白色或淡黃棕色，皺紋不明顯
- 切面淺黃色，半透明，佈滿黃白色筋脈小點
- 斷面呈角質樣，具顆粒質感，質硬而韌，不易折斷
- 氣微，味甜，嚼之有黏性



|| 海玉竹：縱切厚片 ||

北沙參

來源:本品為傘形科植物珊瑚菜 *Glehnia littoralis* Fr. Schmidt ex Miq. 的乾燥根。夏、秋二季採挖，除去鬚根，洗淨，稍晾，置沸水中燙後，除去外皮，乾燥。或洗淨直接乾燥。《中國藥典》規定北沙參未去外皮者，洗淨乾燥也可做藥材，但實際流通中多去外皮，因而未去皮者未列入規格。

產地:山東、河北、內蒙古等地。（北沙參也稱「萊陽沙參」、「遼沙參」，以山東萊陽產品最為道地有名。）

商品規格劃分:1. 河北北沙參、2. 內蒙古北沙參（河北北沙參粗短，且去皮不太乾淨，多做飲片用；內蒙古北沙參細長，去皮乾淨，常裝箱發廣州等市場，做精品藥材用。）

要求:無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質不得過 3%。

常見商品名稱:沙參、沙參節、原色沙參、萊陽沙參、遼沙參。

術語	定義
上中部直徑	藥材塊根全長中部的上折半處（約為全長四分之一處），最粗部位的直徑

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
河北北沙參	選貨	乾貨。呈細長圓柱形，偶有分枝，表面淡黃白色至黃棕色，略粗糙。全體有細縱皺紋及縱溝，並有棕黃色點狀細根痕；頂端常留有黃棕色根莖殘基；上端稍細，中部略粗，下部漸細。質脆，易折斷，斷面皮部淺黃白色，木部黃色。氣特異，味微甘	條長 $\geq 15\text{cm}$ ，上中部直徑 $\geq 1\text{cm}$ ；偶有殘存外皮
	統貨		大小不分；殘存外皮較多，表面黃棕色
內蒙古北沙參	選貨	乾貨。呈細長圓柱形，偶有分枝，表面淡黃白色，略粗糙，偶有殘存外皮。全體有細縱皺紋和縱溝，並有棕黃色點狀細根痕；頂端常留有黃棕色根莖殘基；上端稍細，中部略粗，下部漸細。質脆，易折斷，斷面皮部淺黃白色，木部黃色。氣特異，味微甘	條長 $\geq 20\text{cm}$ ，上中部直徑 $\geq 0.5\text{cm}$
	統貨		大小不分

商品性狀特徵：

內蒙古北沙參


- 呈細長圓柱形，偶有分支
- 表面淡黃白色，質地粗糙，偶有殘存外皮
- 有細縱皺紋和縱溝，並有棕黃色點狀細根痕
- 上端稍細，中部略粗，下部漸細
- 質脆，易折斷。斷面皮部淺黃白色，木部黃色
- 氣特異，味微甘



|| 內蒙古北沙參 (原枝) ||

河北北沙參

- 呈細長圓柱形，偶有分枝
- 表面淡黃白色至黃棕色，略粗糙；有細縱皺紋及縱溝，並有棕黃色點狀細根痕
- 斷面皮部淺黃白色，木部黃色
- 質脆，易折斷



|| 河北北沙參：切段 (短段) ||

附：香港常見商品規格

北沙參（扎）

- 由多個長度一致的北沙參短段疊加，並用橡皮筋或繩扎成捆
- 整體呈圓柱形
- 其餘特徵與內蒙古北沙參一致

整體呈圓柱形

用橡皮筋扎成一捆



|| 內蒙古北沙參：切段，扎 ||

百合

來源：本品為百合科植物卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb.、百合 *L. brownii* F. E. Brown var. *viridulum* Baker 或細葉百合 *L. pumilum* DC. 的乾燥肉質鱗葉。秋季採挖，洗淨，剝取鱗葉，放入沸水中略燙，乾燥。

產地：湖南、湖北、甘肅、江西、江蘇、浙江、河南、河北等地亦有出產。

商品規格劃分：1. 卷丹百合、2. 龍牙百合。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：百合、蘭州百合、龍牙百合。

術語	定義
卷丹百合	來源為百合科植物卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb. 的乾燥肉質鱗葉，按基原分類，習稱「卷丹百合」
龍牙百合	來源為百合科植物百合 <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown var. <i>viridulum</i> Baker 的乾燥肉質鱗葉，按基原分類，習稱「龍牙百合」
邊皮	百合藥材採用篩分法進行分等，除去黑皮和蟲傷片，再根據色澤等外觀分揀出麻色（有斑點）、帶黑邊等雜片，這部分雜片多為鱗葉外層部分，一般稱為「邊皮」
心材	百合藥材除去黑皮和蟲傷片，分揀出邊皮片等雜片後剩餘的部分多為鱗葉中片和心片，稱為「心材」
炕貨	將鮮百合分層剝開、分裝、洗淨、晾乾表面水分後，置於烘炕上，控溫 80 °C 烘乾，然後將烘乾後的鱗片置室內 2 ~ 3 天回軟，使乾片內外水分一致，即為「炕貨」
曬貨	將鮮百合分層剝開、分裝、洗淨後，置沸水中 5 ~ 10 min，並及時翻動，待鱗片邊緣變軟，背面有微裂時迅速撈出，用清水洗去表面黏液，薄攤曬乾，即為「曬貨」
鱗葉長度	百合藥材鱗葉單片的長度
鱗葉寬度	百合藥材鱗葉單片最寬處的寬度


外觀等級劃分：

規格		等級	性狀特徵	
			共同點	區別點
卷 丹 百 合	選 貨	一等	乾貨。呈長卵圓形，表面黃白色至淡棕黃色，有數條縱直平行的白色維管束。頂端尖，基部較寬，邊緣薄，微波狀，略向內彎曲。質硬而脆，斷面較平坦，角質樣。氣微，味微苦	3.0cm< 長度 ≤5.0cm，1.5cm< 寬度 ≤2.0cm，中部厚 1.3-4mm
		二等		長度 2.5-3.0cm，寬度 1.3-1.5cm，中部厚 1.3-4mm
		三等		2cm≤ 長度 <2.5cm，1cm≤ 寬度 <1.3cm，中部厚 1.3-4mm
	統 貨	大統		2.5cm< 長度 ≤5.0cm，1.4cm< 寬度 ≤2.0cm，中部厚 1.3-4mm
		小統		2cm≤ 長度 ≤2.5cm，1cm≤ 寬度 ≤1.4cm，中部厚 1.3-4mm
	龍 牙 百 合	選 貨		一等
二等			長度 3.5-4.5cm，寬度 1.4-1.7cm，中部厚 2-4mm	
三等			2cm≤ 長度 <3.5cm，1cm≤ 寬度 <1.4cm，中部厚 2-4mm	

商品性狀特徵：

卷丹百合

- 呈長卵圓形，表面黃白色至淡棕黃色，有的微帶紫色，間有褐斑片，有數條縱直平行的白色維管束
- 頂端尖，基部較寬，邊緣薄，微波狀，略向內彎曲
- 質硬而脆，斷面較平坦，角質樣
- 氣微，味微苦



|| 卷丹百合 ||

龍牙百合

- 呈長橢圓形，表面乳白色至淡黃色，有數條縱直平行的白色維管束
- 頂端稍尖，基部稍寬，邊緣薄，微波狀，略向內彎曲
- 質硬而脆，斷面較平坦，角質樣



|| 龍牙百合 ||

附：香港常見混淆商品

蘭州百合 為百合科蘭州百合 *Lilium davidii* var. *willmottiae* (Wils.) Raffill 的乾燥肉質鱗葉。為川百合的變種，作蔬菜食用，也稱為「菜百合」。

- 呈長橢圓形、卵圓形
- 表面黃白色，局部略顯淡棕黃色或有時微帶紫色，有數條縱直平行的維管束
- 頂端稍尖，基部較寬，邊緣薄，微波狀，略向內彎曲
- 質硬而脆，斷面較平坦，角質樣
- 氣微，味甜



|| 蘭州百合 ||

西洋參

來源:本品為五加科植物西洋參 *Panax quinquefolium* L. 的乾燥根。均為栽培品，秋季採挖，洗淨，曬乾或低溫乾燥。

產地: 原產於美國 (威斯康辛州) 及加拿大 (安大略省)，統稱「進口西洋參」，而產於美國的西洋參，一般習稱為「花旗參」。自中國內地成功引種後，則稱為「國產西洋參」，其產區主要分布在吉林、山東、北京等地。

商品規格劃分: 1. 原叢、2. 圓粒、3. 短粒、4. 枝。

要求: 不走油、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱: 花旗參、洋參、加拿大參、國產洋參等。

術語	定義
原叢	只剪去鬚根的產品
圓粒	修剪後主根長度與直徑較接近的產品
短粒	修剪後主根長度明顯大於直徑的產品
枝	修剪後用於切片的軟支產品
皮孔	西洋參表面具有的線狀突起
疤痕	西洋參根因病、蟲、鼠害及機械損傷和人為損傷等原因留下的痕跡
紅支	西洋參加工不當，表面變紅，樹脂道變成暗紅色的產品
青支	西洋參加工不當，表面變青，參根內部也呈青色的產品
硬支西洋參	加工溫度高於 50℃，硬度大，斷面乳白色，維管束紅點多，粉性大，氣微而特異，味微苦、甘，不適於切片的乾燥加工產品
軟支西洋參	加工溫度低於 50℃，硬度小，斷面黃白色，油性大，氣微而特異，味微苦、甘，適於切片的乾燥加工產品

規格等級劃分：

類型	規格 /g	平均單支重 /g	長度 /cm
原叢	35 以上	≥35.0	/
	30	≥30.0	/
	25	≥25.0	/
	20	≥20.0	/
	15	≥15.0	/
	10	≥10.0	/
	7	≥7.0	/
	5	≥5.0	/
	3.5	≥3.5	/
	3	≥3.0	/
	2.5	≥2.5	/
	2	≥2.0	/
	1.5	≥1.5	/
	1	≥1.0	/
圓粒、短粒	25 以上	≥25.0	/
	20	≥20.0	/
	15	≥15.0	/
	10	≥10.0	/
	7	≥7.0	/
	5	≥5.0	/
	3.5	≥3.5	/
	3	≥3.0	/
	2.5	≥2.5	/
	2	≥2.0	/
	1.5	≥1.5	/
	1	≥1.0	/

枝	25 以上	≥25.0	≥6
	20	≥20.0	
	15	≥15.0	
	10	≥10.0	
	7	≥7.0	
	5	≥5.0	

外觀等級劃分：

項目	性狀特徵		
	特等	一等	二等
形狀	紡錘形、圓柱形或圓錐形、類圓球形		
表面性狀	表面淺黃褐色或黃白色，可見橫向環紋和線形皮孔狀突起		
蘆頭	有，已修剪		有，已修剪或未修剪
縱皺紋	細密	有	有或無
斷面	黃白色，平坦，可見樹脂道斑點，形成層環紋明顯呈棕黃色		黃白色，或淺黃棕色，平坦，可見樹脂道斑點，形成層環紋明顯呈棕黃色
氣味	氣微而特異，味微苦、甘，氣味濃	氣微而特異，味微苦、甘，氣味較濃	氣微而特異，味微苦、甘，氣味尚濃
疤痕	無		有，輕微
紅支、青支、蟲蛀、霉變、雜質	無		

商品性狀特徵：

西洋參原叢

- 呈紡錘形、圓柱形或圓錐形。主根上部有蘆頭殘基（已修剪），中下部有數條側根殘基（已修剪）
- 表面淺黃褐色或黃白色，可見橫向環紋和線形皮孔狀突起，並有細密淺縱皺紋和鬚根痕
- 體重，質堅實，不易折斷
- 氣微而特異，味微苦、甘



|| 西洋參原叢：去蘆，去側根和鬚根（留小段側根） ||

西洋參短粒

- 主根大多呈紡錘形、圓柱形或圓錐形。主根上部有蘆頭殘基（已修剪），中下部沒有側根（已修剪）。
- 表面淺黃褐色或黃白色，可見橫向環紋和線形皮孔狀突起，並有細密淺縱皺紋和鬚根痕
- 體重，質堅實，不易折斷
- 氣微而特異，味微苦、甘




|| 西洋參短粒：去蘆，去側根和鬚根 ||


附：其他常見商品規格

西洋參片（主要由西洋參支斜切或橫切而成）

- 呈長圓形或類圓形薄片
- 切面淡黃白至黃白色，平坦
- 形成層環棕黃色，皮部有黃棕色點狀樹脂道，近形成層環處較多而明顯；木部略呈放射狀紋理



|| 西洋參軟支（進口）：斜切片 ||



|| 西洋參軟支（國產）：斜切片 ||

黃芪

來源：本品為豆科植物蒙古黃芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或 膜 莢 黃 芪 *A. membranaceus* (Fisch.) Bge. 的乾燥根。春、秋二季採挖，除去鬚根和根頭，曬乾。主流商品蒙古黃芪為主流品種，且移栽為主，藥材長度與直徑較均勻。膜莢黃芪的質地較蒙古黃芪堅硬，柴性較大，不易折斷，表皮呈棕褐色，俗稱「黑皮芪」。

產地：(蒙古黃芪)甘肅、山西、內蒙古等地；(膜莢黃芪)東北、山東、河北等地。

商品規格劃分：1. 仿野生黃芪、(野生 / 仿野生黃芪總產量較小，因仿野生黃芪年限較移栽黃芪長，且人工干預較少，品質較移栽黃芪優。) 2. 移栽黃芪

要求：無鬚根、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：

- 北芪(耆)(薯) / 黃耆(薯)：泛指產於北方的黃芪。「芪」、「耆」、「薯」，均為同義或借代字。
- 正芪 / 黑皮芪：產於東北一帶的膜莢黃芪[黑龍江齊齊哈爾(卜奎)一帶的「卜奎芪」、黑龍江東部寧安(寧古塔)一帶的「寧古塔芪」、內蒙古產的「正口芪」]，為野生品種，其外皮灰黑色，內部深黃，皮鬆肉緊，味甘香，嚼之少渣，豆腥味純，品質優良，被認為品質最高。
- 白皮芪：產於山西渾源一帶的蒙古黃芪，有野生(仿野生)和栽培兩大類。
- 沖正芪：選大條皮嫩的白皮芪，切頭去尾，用沸水撩過使其柔潤，用板搓直，以烏青葉煎汁，加青礬、五倍子染黑外皮，傳聞這工藝是為了仿內蒙古產的野生正口芪(皮較黑)，故市場稱「沖正芪」(沖，可能與「冒充」的充同音有關)。
- 炮台芪：傳統按沖正芪加工後，扎成炮台形，故稱「炮台芪」。
- 黑蠡(滄)芪：是香港獨有的黃芪商品名，主要來源於外皮染黑的沖正芪。沖正芪過去區分很細，主要是以加工廠號命名，出名的名牌貨有「通泰興」、「義清源」、「張蠡記」等，其中以「張蠡記」的黑蠡芪最為出名。久而久之，黑蠡芪成了優質黃芪的代名詞，商家為了顯示出售的黃芪來路正宗和品質優勝，常將其出售的黃芪標榜為黑蠡芪。

第一章 根及根莖類

術語	定義
仿野生黃芪	採用人工仿野生模式進行種子直播生長，年限通常 5 年以上，具有部分野生黃芪特徵的黃芪
移栽黃芪	採用育苗一年，移栽生長 1-2 年方式進行栽培，從育苗至採收，生長年限為 2-3 年的黃芪
頭部斬口下 3.5cm 處直徑	切去黃芪藥材蘆頭及空心面積大於 1/3 處，斬口下方 3.5cm 的處的直徑


外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
仿野生黃芪	特等	乾貨，呈圓柱形，有的有分枝，上端較粗，表面淡棕黃色或棕褐色，有不整齊的縱皺紋或縱溝。質硬而韌，不易折斷，斷面纖維性強，並顯粉性，皮部黃白色，木部淡黃色，有放射狀紋理。氣微，味微甜，嚼之微有豆腥味	長 ≥40cm，頭部斬口下 3.5cm 處直徑 ≥1.8cm
	一等		長 ≥45cm，頭部斬口下 3.5cm 處直徑 1.4-1.7cm
	二等		長 ≥45cm，頭部斬口下 3.5cm 處直徑 1.2-1.4cm
	三等		長 ≥30cm，頭部斬口下 3.5cm 處直徑 1.0-1.2cm
移栽黃芪	大選	表皮平滑，根皮較柔韌，斷面緻密，木心中央黃白色，質地堅實	長 ≥30cm，頭部斬口下 3.5cm 處直徑 ≥1.4cm
	小選		長 ≥30cm，頭部斬口下 3.5cm 處直徑 ≥1.1cm
	統貨		長短不分，粗細不均勻，頭部斬口下 3.5cm 處直徑 ≥1.0cm

商品性狀特徵：

移栽黃芪

- 呈圓柱形、表面光滑
- 表面淡棕黃色或淡棕褐色，有不整齊的縱皺紋或縱溝
- 皮部黃白色，木部淡黃色，斜切面纖維性，有放射狀紋理
- 質硬而韌，不易折斷，斷面纖維性強，並顯粉性



|| 移栽黃芪 (蒙苦黃芪) (炮台芪) : 原支, 扎 ||

其他商品性狀特徵：

移栽黃芪

- 斜圓形片狀
- 其餘性狀特徵與移栽黃芪相同



|| 移栽黃芪 (蒙苦黃芪) : 斜切片 ||

仿野生黃芪片

- 表皮粗糙，根皮綿韌
- 斷面皮部有裂隙，木心黃，質地鬆泡，老根中心有的呈枯朽狀，黑褐色或呈空洞



|| 仿野生黃芪 (蒙苦黃芪) : 斜切片 ||



|| 仿野生黃芪 (膜莢黃芪) : 橫切片 ||

黃芪長片 / 長壓片

- 長條片狀 (或有壓扁)
- 外皮粗糙，呈淺棕色，有不整齊的縱皺紋，偶可見橫長皮孔
- 斜切面黃白色，隱約可見米白色的皮部和黃色的木部；皮部與木部緊貼，無空隙
- 外皮易剝落，切面纖維性，有網狀紋理
- 質堅硬不易折斷



|| 移栽黃芪 (蒙苦黃芪) : 長斜切片 ||



|| 移栽黃芪 (蒙苦黃芪) : 長斜切壓寬片 ||

第一章 根及根莖類

黑蠶芪

- 性狀如黃芪長切片
- 外皮粗糙，殘留深褐色至黑色斑塊



|| 移栽黃芪 (蒙苦黃芪): 外皮染黑, 長斜切片 ||



|| 移栽黃芪 (蒙苦黃芪): 外皮染黑, 長斜切壓寬片 ||

附：香港常見混淆商品

紅芪 為豆科植物多序岩黃芪 *Hedysarum polybotrys* Hand. -Mazz. 的乾燥根。春、秋二季採挖，除去鬚根和根頭，曬乾。主產甘肅、寧夏等地。部分地方作黃芪替代品使用。香港習稱為紅芪、紅耆（耆）、紅皮耆、晉芪等。

- 呈類圓形或橢圓形
- 外皮紅棕色或黃棕色，較易脫落
- 切面皮部黃白色，形成層環淺棕色，木質部淡黃棕色，呈放射狀紋理
- 質地較硬，不易折斷
- 氣微，味微甜，嚼之有豆腥味

木質部淡黃棕色



形成層環淺棕色



1cm

|| 紅芪：斜切片（瓜子片） ||

國內市場上有川黃芪（川芪）流通，其來源為豆科植物梭果黃芪 *Astragalus emestii* Comb.、多花黃芪 *A. floridus* Benth.、金翼黃芪 *A. chrysopterus* Bge. 的乾燥根，為地方藥材標準收載，應注意區別。

當歸

來源：本品為傘形科植物當歸 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的乾燥根。秋末採挖，除去鬚根和泥沙，待水分稍蒸發後，捆成小把，上棚，用煙火慢慢熏乾。

產地：甘肅省岷縣、武都、漳縣、成縣、文縣等地。多為栽培。

商品規格劃分：1. 全歸 2. 歸頭

要求：無變色、不走油、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：岷歸、原色當歸、全歸片、當歸頭、西歸頭、當歸尾、白大歸片、當歸扇片。

術語	定義
合口	根頭部圓鈍，有紫色或黃綠色莖痕及殘存的葉柄基部殘痕。
全歸	除雜修整後的當歸完整乾燥根
歸頭	去除莖葉殘基和歸尾後的當歸乾燥主根部分
胡首（歸）	是一種當歸藥材的商品規格，指歸頭，但實際上包括歸頭和歸身。

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
全歸	一等	上部主根圓柱形，或具數明顯突出的根莖痕，下部有多條支根，根梢直徑0.3-1cm。表面棕黃色或黃褐色，具縱皺紋，皮孔樣突起，不明顯或無；質地柔韌，斷面黃白色或淡黃色，木部色較淡，具油性，皮部有多數棕色點狀分泌腔，形成層環黃棕色。有濃郁的香氣，味甘、辛、微苦	每公斤支數 $n \leq 15$ ，單支重 $\geq 60g$ ；根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕
	二等		每公斤支數 15-40，單支重 25-60g；根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕
	三等		每公斤支數 40-70，單支重 15-25g；根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕
	四等		每公斤支數 70-110，單支重 10-15g；根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕
	五等		每公斤支數 $n > 110$ ，單支重 $< 10g$ ；根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕
	統貨		每公斤支數 $n > 110$ ，單支重 $< 10g$ ；根莖痕有或無；主根或有部分腿渣，但主根數量佔 30% 以上，腿渣佔 70% 以下
歸頭	一等	純主根，長圓形或拳狀。表面棕黃色或黃褐色，或撞去粗皮，微露白色至全白色。皮孔樣突起，不明顯或無；根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕；質地稍硬，斷面黃白色或淡黃色，木部色較淡，具油性，皮部有多數棕色點狀分泌腔，形成層環黃棕色。有濃郁的香氣，味甘、辛、微苦	每公斤支數 $n \leq 20$ ，單支重 $\geq 50g$
	二等		每公斤支數 20-40，單支重 25-50g
	三等		每公斤支數 40-80，單支重 15-25g
	四等		每公斤支數 $n > 80$ ，單支重 $< 15g$
	統貨		每公斤支數 10-90，單支重 10-60g

甘肅岷縣等地傳統有專門用於出口的「箱歸」，為當歸按規格標準加工後，成品整齊擺放紙箱。其外觀形態與同等級當歸藥材相比，更為規整、長度統一，身長不超過 13cm，去淨毛鬚和尾鬚，因該品主要銷往港、澳、台地區和東南亞等國家。

商品性狀特徵：

全歸

- 上部主根圓柱形，或具數明顯突出的根莖痕，下部有多條支根
- 表面棕黃色或黃褐色，具縱皺紋，皮孔樣突起，不明顯或無
- 質地柔韌，斷面黃白色或淡黃色，木部色較淡，具油性
- 皮部有多數棕色點狀分泌腔，形成層環黃褐色
- 有濃郁的香氣



|| 全歸 (馬尾歸) ||

歸頭

- 純主根，長圓形或拳狀
- 表面棕黃色或黃褐色，或撞去粗皮，微露白色至全白色
- 皮孔樣突起，不明顯或無；根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕
- 質地稍硬，斷面黃白色或淡黃色，木部色較淡，具油性，皮部有多數棕色點狀分泌腔，形成層環黃棕色
- 有濃郁的香氣



|| 歸頭：去側根和鬚根 ||

全歸片

- 呈長三角形薄片
- 切面木部黃白色，皮部黃棕色
- 質柔韌有彈性，斷口角質狀
- 有濃郁的香氣



紅棕色紋理及黃
白色紋理相間

1cm

|| 全歸：縱切壓片 ||

歸頭片

- 呈不規則長片狀
- 表皮棕黃色或黃褐色
- 斷面黃白色或淡黃色，木部色較淡，具油性，皮部有多數棕色點狀分泌腔，形成層環黃褐色
- 有濃鬱的香氣

不規則長片狀



散有棕色油點

1cm

|| 歸頭：縱切片 ||

附：其他常見商品規格

歸尾（全歸加工成歸頭的副產物）市場上還可見有全部或主要以當歸支根、鬚根等腿渣作為藥廠投料當歸原料，其含量測定指標，如阿魏酸和揮發油含量等都符合《中國藥典》要求；其外觀缺少主根等部分特徵，不符合性狀鑒別要求。而且其在傳統中醫臨床上曾作為「歸尾」入藥，功效更偏重於活血，與當歸傳統活血補血、潤腸通便、調經止痛的多元功效不一致，不宜作為全當歸入藥，因此國內的藥材標準未列出歸尾規格。

- 呈細長條狀，上粗下細，扭曲
- 外皮深褐色，佈滿縱皺紋，可見殘留的圓形突起鬚根痕和橫向拉長的皮孔樣突起
- 質柔韌。有香氣



|| 歸尾 ||

附：香港常見商品規格

西歸頭（葫首）

- 長圓形或拳狀
- 表面白色，殘留黃褐色表皮
- 根頭上端圓鈍或有明顯突出的根莖痕
- 有濃鬱的香氣

根頭上端圓鈍
或有明顯突出
的根莖痕



長圓形或拳狀

撞去粗皮，表面白色，
殘留黃褐色表皮

1cm

|| 歸頭：撞皮（磨皮 / 削皮）（精磨） ||

白大歸片（白二歸）

- 呈長三角形薄片
- 呈淡黃色，無明顯紋理
- 斷面角質樣
- 具濃烈帶酸味的特殊氣味

斷面角質樣



呈長三角形，
淡黃色，無明
顯紋理

1cm

|| 歸頭：撞皮（磨皮 / 削皮）（精磨）、刨開、壓片、修整、硫熏 ||

黨參

來源：本品為桔梗科植物黨參 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花黨參 *C. pilosula* Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川黨參 *C. tangshen* Oliv. 的乾燥根。秋季採挖，洗淨，曬乾。

產地：山西、陝西、甘肅、四川等地。

商品規格劃分：1. 潞黨參（黨參）、白條黨參（黨參）、2. 紋黨參（素花黨參）、3. 板橋黨參（川黨參）

要求：油條不超過 10%、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：

- 上黨參：泛指山西產黨參，商品以潞黨參【山西長治（唐代稱上黨、潞州）】為主，其餘商品包括紫黨參【唐代山西上黨郡潞州紫團山】、台黨【山西五台山】等
- 白條黨：甘肅產黨參，商品稱白條黨參
- 東黨 / 吉林黨：東北產黨參
- 鳳黨：陝西鳳縣產的黨參
- 西黨 / 西游黨：泛指甘肅、四川一帶所產的素花黨參，人工引種，條粗紋多味甜化渣，素以「獅子盤頭菊花心、外鬆內緊體柔韌」，多出口香港地區或東南亞等地。商品含岷黨 [甘肅岷縣]、紋黨 / 防黨 [甘肅文縣、四川平武，橫紋細密（本草經集注云：狀如防風）]
- 板橋黨：狹義上，指湖北恩施板橋鎮所產的川黨參；廣義上，泛指四川、湖北及陝西接壤地帶所產的川黨參，又稱川黨、板黨、八仙黨、單枝黨、條黨【因分枝較少】
- 巫山黨 / 廟黨：重慶產的川黨參
- 黃參 / 獅頭參：黨參的別稱，因外表色黃，具獅子盤頭而得名

術語	定義
獅子盤頭	指條粗的黨參根頭部分有多數疣狀突起的莖痕及芽，形如中國古代石獅子頭部的疙瘩狀捲曲鬃毛。
油條	由於貯藏或加工不當等原因，使油質或油樣物質泛於黨參表面，變色、變質的稱「油條」。

外觀等級劃分：

規格		等級	性狀特徵				
			共同點	區別點			
				蘆頭下的環狀橫紋	縱皺紋	皮孔樣突起	直徑 (cm)
潞黨參、白條黨參	選貨	一等	呈圓柱形。表面灰黃色、黃棕色至灰棕色。質稍柔軟或略硬而略帶韌性，斷面稍平坦，有裂隙或放射狀紋理，皮部淡棕黃色至黃棕色，木部淡黃色至黃色。有特殊香氣，味甜	稀有橫紋或無	不明顯	散在，不明顯	≥0.9
		二等					0.6-0.9
		三等					0.4-0.6
	統貨	/	呈圓柱形，不分大小				
紋黨參	選貨	一等	呈圓錐形。表面黃白色至灰黃色。質稍柔軟或略硬而略帶韌性，裂隙較多，有放射狀紋理，斷面稍平坦，皮部黃白色。有特殊香氣，味甜	有緻密橫紋，常達全長的一半以上	不明顯	散在，不明顯	≥1.3
		二等					1.0-1.3
		三等					0.5-1.0
	統貨	/	呈圓錐形，不分大小				
板橋黨參	選貨	一等	呈圓錐形。表面灰黃色至黃棕色。質稍柔軟或略硬而略帶韌性，斷面稍平坦，裂隙較少，有放射狀紋理，皮部黃白色。有特殊香氣，味甜	稀有橫紋或無	明顯	散在，突起明顯	≥1.0
		二等					0.7-1.0
		三等					0.5-0.7
	統貨	/	呈圓錐形，不分大小				

商品性狀特徵：

潞黨參

- 呈圓柱形
- 表面灰黃色、黃褐色至灰棕色
- 質稍柔軟或略硬而略帶韌性，斷面稍平坦，有裂隙或放射狀紋理，皮部淡棕黃色至黃棕色，木部淡黃色至黃色
- 有特殊香氣，味甜



|| 潞黨參 ||

白條黨參

- 性狀如潞黨參

呈灰褐棕色，獅子盤頭較小

主根較長，縱皺紋不明顯



|| 白條黨參 ||

紋黨參

- 呈圓錐形
- 表面黃白色至灰黃色
- 質稍柔軟或略硬而略帶韌性，斷面稍平坦，裂隙較多，有放射狀紋理，斷面稍平坦，皮部黃白色
- 有特殊香氣，味甜



|| 紋黨參 ||

板橋黨參

- 呈圓錐形
- 表面灰黃色至黃棕色
- 質稍柔軟或略硬而略帶韌性，斷面稍平坦，裂隙較少，有放射狀紋理，皮部黃白色
- 有特殊香氣，味甜



|| 板橋黨參 ||

第二章 果實及種子類

化橘紅

來源：本品為芸香科植物化州柚 *Citrus grandis* 'Tomentosa' 或柚 *C. grandis* (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的乾燥外層果皮。前者習稱「毛橘紅」、「毛皮」，後者習稱「光橘紅」。在夏季果實未成熟時採收，置沸水中略燙（殺青）後，將果皮割成 5 或 7 瓣，除去果瓢和部分中果皮（切皮），壓製成形，乾燥。

產地：廣東省化州、廉江等地。

商品規格劃分：1. 毛橘紅（毛皮）、2. 光橘紅（光青皮、光黃皮）。

要求：無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：橘紅、柚皮橘紅、化州橘紅、柚子皮、光七爪、光五爪、橘紅片、橘紅個、橘紅壓果、橘紅胎。

外觀等級劃分：

規格		等級	性狀描述
毛橘紅	毛皮	統貨	厚 0.2-0.5cm。外表面黃綠色，密佈茸毛，有皺紋及小油室；內表面黃白色或淡黃棕色，有脈絡紋。質脆，易折斷，斷面不整齊，外緣有 1 列不整齊的下凹的油室，內側稍柔而有彈性。氣芳香，味苦、微辛
光橘紅	光青皮	統貨	厚 0.2-0.5cm。外表面黃綠色至黃棕色，無毛，有皺紋及小油室；內表面黃白色或淡黃棕色，有脈絡紋。質脆，易折斷，斷面不整齊，外緣有 1 列不整齊的下凹的油室，內側稍柔而有彈性。氣芳香，味苦、微辛
	光黃皮	統貨	厚 0.2-0.5cm。外表面黃色或黃棕色，無毛，有皺紋及小油室；內表面黃白色或淡黃棕色，有脈絡紋。質脆，易折斷，斷面不整齊，外緣有 1 列不整齊的下凹的油室，內側稍柔而有彈性。氣芳香，味苦、微辛

目前廣東和廣西地區多把化州柚幼果加工成圓果或長果，市場調研發現該規格已成為主流，而《中國藥典》規定正品的化橘紅市場反而難以購買到，需注意。其中，外表面密被短毛茸者為正毛，毛茸較稀疏者為副毛。因未按《中國藥典》要求去掉非藥用部位，且性狀不符合要求，不制定此規格。

商品性狀特徵：

毛橘紅（毛皮）

- 對折的七角、五角或展平的五角星狀，單片呈柳葉形
- 外表面黃綠色，密佈茸毛，有皺紋及小油室
- 內表面黃白色或淡黃褐色，有脈絡
- 質地脆，易折斷，斷面不整齊，外緣有 1 列不整齊的下凹的油室，內側稍柔而有彈性
- 氣芳香，味苦、微辛




|| 毛橘紅（毛皮）：七爪工藝 ||

附：其他常見商品規格

化橘紅胎 為芸香科植物化州柚 *Citrus grandis* 'Tomentosa' 的乾燥幼果。春末夏初果實未成熟時採收，殺青，乾燥；或殺青後壓製成圓柱形，乾燥；或殺青後縱切為二或四瓣，乾燥；或切片，殺青，乾燥。主產於廣東省化州、廉江等地。

- 呈近球形、圓柱形、半球形、四分之一球形或類圓片狀
- 表面黃綠色至墨綠色，密佈茸毛，有皺紋及小油室
- 中果皮黃白色至黃棕色，有脈絡紋
- 完整者可見先端有花柱脫落的痕跡，基部有圓形果柄的疤痕
- 質堅硬，氣芳香，味苦、微辛



|| 毛橘紅（幼果） ||

赤小豆

來源：本品為豆科植物赤小豆 *Vigna umbellata* Ohwi et Ohashi 或赤豆 *V. angularis* Ohwi et Ohashi 的乾燥成熟種子。秋季果實成熟而未開裂時拔取全株，曬乾，打下種子，除去雜質，再曬乾。

產地：浙江、湖南、江西、廣東等亦有出產。

商品規格劃分：1. 赤小豆、2. 赤豆（香港習稱「紅豆」，主要用於甜品食材）。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：紅豆、紅小豆、朱小豆、（紅）飯豆。

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀描述
赤小豆統貨	/	乾貨。呈長橢圓狀而稍扁，長 5-8mm，直徑 3-5mm。表面紫紅色，無光澤或微有光澤，一側可見種臍，呈線狀突起，偏向一端，白色，約全長 2/3，中間凹陷成縱溝。背面有 1 條不明顯的稜脊。質硬，不易破碎，子葉 2，乳白色。氣微，味微甘。無蟲蛀、霉變
赤豆統貨	/	乾貨。呈短圓柱形，兩端較平截或鈍圓，直徑 4- 6mm。表面暗棕紅色，有光澤，種臍不突起。無蟲蛀、霉變

商品性狀特徵：

赤小豆

- 呈長橢圓狀而稍扁，表面紫紅色，無光澤或微有光澤
- 一側有線形突起的種臍，偏向一端，白色，約為全長 2/3，中間凹陷成縱溝；背面有 1 條不明顯的稜脊
- 質硬，不易破碎



赤小豆

第二章 果實及種子類

赤豆

- 呈短圓柱形，兩端較平截或鈍圓
- 表面暗棕紅色，有光澤
- 種臍不突起



芡實

來源：本品為睡蓮科植物芡 *Euryale ferox* Salisb. 的乾燥成熟種仁。秋末冬初採收成熟果實，除去果皮，取出種子，洗淨，再除去硬殼（外種皮），曬乾。

產地：廣東肇慶、江蘇、安徽、湖南、湖北、山東等地。

商品規格劃分：根據市場流通情況，未對藥材進行規格劃分。但根據芡實種子（除去外種皮）直徑的大小，將芡實分為 12 厘、11 厘、10 厘、9 厘、8 厘、7 厘六個等級。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：雞頭米、雞頭實、肇實、北芡、南芡、蘇芡、生芡實、熟芡實。

術語	定義
厘	單個芡實種子（去外種皮）的平均直徑。

外觀等級劃分：

等級	性狀描述	
	共同點	區別點
12 厘	本品呈類球形。表面有棕紅色或紅褐色內種皮，一端黃白色，約佔全體 1/3，有凹點狀的種臍痕，除去內種皮顯白色。質較硬，斷面白色，粉性。氣微，味淡。	芡實種子（除去外種皮）直徑 $\geq 10\text{mm}$
11 厘		芡實種子（除去外種皮）直徑 $\geq 9\text{mm}$ ，且 $< 10\text{mm}$
10 厘		芡實種子（除去外種皮）直徑 $\geq 8\text{mm}$ ，且 $< 9\text{mm}$
9 厘		芡實種子（除去外種皮）直徑 $\geq 7\text{mm}$ ，且 $< 8\text{mm}$
8 厘		芡實種子（除去外種皮）直徑 $\geq 6\text{mm}$ ，且 $< 7\text{mm}$
7 厘		芡實種子（除去外種皮）直徑 $\geq 5\text{mm}$ ，且 $< 6\text{mm}$

商品性狀特徵：

芡實(肇實)

肇實與一般芡實的採收不同，一般芡實、果實成熟時即摘苞取核；而肇實則在初冬果熟後，讓其自然地跌落冰冷的湖水（或採收果實後泡在湖水中），浸逾一個月後才撈起使用，稱為「水下熟」，使肇實較一般芡實粉性，種皮色深，有清晰的蟋蟀紋，煲煮後製成菊花狀，極其鬆化。

- 呈類球形
- 表面有棕紅色或紅褐色內種皮，一端黃白色，約佔全體 1/3，有凹點狀的種臍痕，除去內種皮顯白色
- 質較硬，斷面白色，粉性
- 氣微，味淡

一端黃白色，
約佔全體 1/3

不規則脈狀網紋



斷面白色，粉性

1cm

|| 芡實(肇實)：開邊 ||

附：香港常見商品規格

製芡實

- 表面及斷面呈蠟樣狀，色調較暗啞
- 斷面中心或會有白點
- 微有鹹味
- 其餘特徵與芡實一致



|| 芡實：開邊、鹽水蒸製 ||

枸杞子

來源：本品為茄科植物寧夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 的乾燥成熟果實。夏、秋二季果實呈紅色時採收，熱風烘乾，除去果梗，或晾至皮皺後，曬乾，除去果梗。

產地：寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、青海等地。

商品規格劃分：不設規格，只有四個等級劃分。

要求：無變色、不走油、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：

- 寧夏枸杞：泛指於寧夏回族自治區出產的枸杞子
- 中寧枸杞 / 寧安枸杞：於寧夏回族自治區中寧縣出產的枸杞子，是寧夏枸杞的一種，被喻為枸杞子的道地藥材
- 青海枸杞：泛指於青海省出產的枸杞子
- 柴杞：於青海柴達木盆地出產的枸杞子，是青海枸杞的一種，被喻為最優質的青海枸杞
- 新疆枸杞：泛指新疆維吾爾自治區出產的枸杞子
註：亦可泛指作食用的新疆枸杞 *Lycium dasystemum* Pojark.，這並非藥典所指的枸杞子，小心區分，不可胡亂替代
- 精河枸杞：於新疆維吾爾自治區精河縣出產的枸杞子，是新疆枸杞的一種
- 杞子、枸杞：枸杞子的別名
- 貢杞、頂杞、特杞：高品質枸杞的商品稱謂

【注意：小心區分另一個以食用為重的同屬品種——枸杞（中華枸杞）*Lycium chinense* Miller】

術語	定義
油果	成熟過度或雨後採摘的鮮果因烘乾或晾曬不當，保管不好，顏色變深，明顯與正常枸杞不同的顆粒
不完善粒	破碎粒、未成熟粒、油果尚有使用價值的枸杞子
50 克粒數	每 50 克枸杞子藥材的粒數

外觀等級劃分：

等級	性狀描述		
	共同點	區別點	
		粒度 (粒 / 50 克)	不完善粒 (%)
一等	呈類紡錘形或橢圓形，表面紅色或暗紅色，頂端有小突起狀的花柱痕，基部有白色的果梗痕。果皮柔韌，皺縮；果肉肉質，柔潤。種子 20-50 粒，類腎形，扁而翹，表面淺黃色或棕黃色。氣微，味甜	≤280	≤1.0
二等		≤370	≤1.5
三等		≤580	≤3.0
四等		≤900	≤3.0

枸杞子藥材產地較多，且不同產地間性狀差異明顯，而按照產地無法明顯量化界定，且還存在種系的複雜性的問題，缺乏一定的可操作性，故本標準不按產地進行商品規格劃分。

商品性狀特徵：

枸杞子

- 呈類紡錘形或橢圓形
- 表面紅色或暗紅色，頂端有小突起狀的花柱痕，基部有白色的果梗痕
- 果皮柔韌，皺縮；果肉肉質，柔潤
- 氣微，味甜



|| 枸杞子 ||

附：香港常見商品規格

黑果枸杞（黑枸杞）為茄科植物黑果枸杞 *Lycium ruthenicum* Murray 的果實。夏、秋二季果實呈紫黑色時採收，熱風烘乾，或曬乾，除去果梗，主產甘肅、青海、新疆、西藏等地。此品並非藥典所指的枸杞子，兩者基源不同，不可胡亂替代。

- 呈類圓形或橢圓形
- 表面紫黑色，頂端有微小突起的花柱痕，基部有白色的果梗痕，或灰綠色花萼，常帶柄
- 果皮皺縮，果肉乾癟



|| 黑果枸杞 ||

陳皮

來源：本品為芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培變種的乾燥成熟果皮。藥材分為「陳皮」和「廣陳皮」。採摘成熟果實，剝取果皮，曬乾或低溫乾燥。（市場以不同乾燥方式分炕乾和曬乾兩種，性狀區別不大）

產地：廣東、四川、貴州、雲南、湖南、江西、江蘇、浙江、福建等地。

商品規格劃分：1. 廣陳皮、2. 陳皮。

要求：無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：柑皮、果皮、新會陳皮、大紅皮、二紅皮。

外觀等級劃分：

規格		等級	性狀特徵	
			共同點	區別點
廣陳皮	選貨	一等	常 3 瓣相連，形狀整齊，厚度均勻，約 1mm。點狀油室較大，對光照視，透明清晰。質較柔軟。氣香，味辛、苦	外表面橙紅色或棕紫色，顯皺縮。內表面白色、略呈海棉狀
		二等		外表面橙紅色或紅棕色，內表面類白色、較光潔
	統貨	/	常 3 瓣相連，形狀整齊，厚度均勻，約 1mm。外表面橙紅色、紅棕色或棕紫色，內表面白色或類白色。點狀油室較大，對光照視，透明清晰。質較柔軟。氣香，味辛、苦	
陳皮	統貨	/	常剝成數瓣，基部相連，有的呈不規則的片狀，厚 1-4mm。外表面橙紅色或紅棕色，有細皺紋和凹下的點狀油室；內表面淺黃白色，粗糙，附黃白色或黃棕色筋絡狀維管束。質稍硬而脆。氣香，味辛、苦	


廣陳皮，又名「新會陳皮」，產區主要為廣東省江門市新會區。為芸香科植物茶枝柑 *Citrus reticulata* 'Chachiensis' 的乾燥成熟果皮，為芸香科植物橘的其中一個栽培變種。

現時有藥農將茶枝柑引種至新會以外其他地區，其外觀與新會主產區的廣陳皮相似，但價格相距甚遠，採購時應小心分辨。

商品性狀特徵：

廣陳皮



- 常3瓣相連，形狀整齊，基部相連，厚度均勻
- 點狀油室較大，對光照視，透明清晰
- 質較柔軟
- 氣清香，味甘、微辛



|| 廣陳皮：正三刀切 ||

陳皮

- 常剝成數瓣，基部相連，有的呈不規則的片狀
- 外表面橙紅色或紅棕色，有細皺紋和凹下的點狀油室
- 內表面淺黃白色，粗糙，附黃白色或黃棕色筋絡狀維管束
- 質稍硬而脆
- 氣香，味辛、苦



|| 陳皮 ||

酸棗仁

來源：本品為鼠李科植物酸棗 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的乾燥成熟種子。秋末冬初採收成熟果實，除去果肉和核殼，收集種子，曬乾。

產地：主產於河北、陝西、遼寧、河南等地。

商品規格劃分：1. 選貨、2. 統貨。

要求：無變色、無走油、無蟲蛀、無霉變、雜質（核殼等）少於 5%。

常見商品名稱：棗仁、炒棗仁。

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
選貨	一等	乾貨。呈扁圓形或扁橢圓形。表面紫紅色或紫褐色，平滑有光澤，有的有裂紋。有的兩面均呈圓隆狀突起；有的一面較平坦，中間有 1 條隆起的縱線紋；另一面稍突起。一端凹陷，可見線形種臍；另端有細小突起的合點。種皮較脆，胚乳白色，子葉 2，淺黃色，富油性。氣微，味淡	飽滿。核殼 ≤2%，碎仁 ≤2%。無黑仁
	二等		較飽滿。核殼 ≤5%，碎仁 ≤5%
統貨	/	乾貨。呈扁圓形或扁橢圓形，飽滿度、碎仁率不一，核殼 ≤5%	

商品性狀特徵：

酸棗仁

- 呈扁圓形或扁橢圓形，表面紫紅色或紫褐色，平滑有光澤，有的有裂紋
- 有的兩面均呈圓隆狀突起；有的一面較平坦，中間有 1 條隆起的縱線紋；另一面稍突起
- 一端凹陷，可見線形種臍；另端有細小突起的合點
- 種皮較脆，胚乳白色，子葉 2，淺黃色，富油性
- 氣微，味淡



|| 酸棗仁選貨 ||

附：其他常見商品規格

炒酸棗仁

- 性狀如酸棗仁
- 表面微鼓起，微具焦斑，有的種皮破裂，可見乳白色胚乳
- 略有焦香氣，味淡



|| 炒酸棗仁 ||

附：香港常見混淆商品

理棗仁（滇棗仁）為鼠李科植物滇刺棗 *Ziziphus mauritiana* Lam. 的乾燥成熟種子。主產於雲南、緬甸等地。市場又稱理棗仁為「緬棗仁」或「進口棗仁」。

- 呈扁圓形或扁橢圓形，常有破裂現象
- 外皮黃棕色至紅棕色，有光澤，表面有淡黃色斑點和花紋
- 一面呈圓隆狀突起，另一面較平坦或向內微凹，中間無明顯隆起的縱線紋
- 氣微，味淡



|| 理棗仁（滇棗仁） ||

染色兵豆 本品為豆科植物兵豆 *Vicia lens* (L.) Coss. et Gern. 的成熟種子。產地為雲南、甘肅、內蒙古、河北、山西、陝西等地。

- 呈扁圓形，側面觀察呈雙凸鏡形
- 外皮紫紅色，光滑或略皺縮，不易破損
- 具不均勻的紫紅色斑紋
- 種臍微微凹入，不明顯
- 氣微，口嘗有豆腥氣



|| 兵豆：染色 ||

蓮子

來源：本品為睡蓮科植物蓮 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的乾燥成熟種子。秋季果實成熟時採割蓮房，取出果實，除去果皮，乾燥，或除去蓮子心後乾燥。不去種皮為紅蓮，去除種皮為白蓮。

產地：福建、湖南、湖北、江蘇、浙江、江西等地亦有出產。

商品規格劃分：1. 紅蓮、2. 白蓮（手工白蓮、磨皮白蓮）。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變。

常見商品名稱：湘蓮（產於湖南湘潭縣及其周邊各地區）、建蓮（產於福建建甌、建寧、建陽等地）、蓮子肉、紅蓮子、白蓮子、開邊蓮子、去芯蓮子。

術語	定義
寬度	蓮子藥材的最大直徑

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
紅蓮	統貨	表面紅色，有細縱紋和脈紋，飽滿圓潤。一端中心微有突起，頂端鈍圓，紅棕色，無裂口，底部具針眼狀小孔。湖南紅蓮子質硬，種皮沒有經過機器打磨，不易剝離，紅棕色	/
白蓮	大選	手工白蓮： 表面淺黃色至黃白色，有的細縱紋和較寬的脈紋，呈皺縮樣，有的比較飽滿油潤。頂端中心乳頭狀突起，頂端尖，淺棕色，有裂口，其周邊略下陷，底部具針眼狀小孔	寬 ≥11mm
	小選	磨皮白蓮： 表面粉色至黃白色，無細縱紋和脈紋，光滑，粉性比較明顯。兩端中心微有突起，頂端鈍圓，紅棕色，無裂口，底部有針眼狀小孔，兩端多有加工過程中沒有打磨乾淨的種皮	寬 <11mm
	統貨		寬：8-12mm

《中國藥典》標準蓮子藥材為紅蓮，但根據歷史藥用情況和市場需求，蓮子藥材應包括紅蓮和白蓮。

商品性狀特徵：

紅蓮

- 略呈橢圓形或類球形
- 表面紅色，有細縱紋和脈紋。一端中心微有突起，頂端鈍圓，紅棕色，無裂口，底部具針眼狀小孔
- 質硬，種皮薄，不易剝離



|| 紅蓮 ||

白蓮 (手工白蓮)


- 表面淺黃色至黃白色，有的細縱紋和較寬的脈紋，呈皺縮樣，有的比較飽滿油潤
- 頂端中心乳頭狀突起，頂端尖，淺棕色，有裂口，其周邊略下陷，底部具針眼狀小孔



|| 白蓮 (手工白蓮) : 手工去皮 ||

白蓮（磨皮白蓮）

- 表面粉色至黃白色，無細縱紋和脈紋，光滑，粉性比較明顯
- 兩端中心微有突起，頂端鈍圓，紅棕色，無裂口
- 底部有針眼狀小孔，兩端多有加工過程中沒有打磨乾淨的種皮



|| 白蓮（磨皮白蓮）：機器磨皮，去芯 ||

薏苡仁

來源：本品為禾本科植物薏米 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf 的乾燥成熟種仁。秋季果實成熟時採割植株，曬乾，打下果實，再曬乾，除去外殼、黃褐色種皮和雜質，收集種仁。

產地：河北、福建、遼寧、浙江等地。

商品規格劃分：1. 國產薏苡仁、2. 進口薏苡仁。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：大薏仁、薏仁、薏米、薏珠子、回回米、草珠兒。

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
國產	選貨	乾貨。呈寬卵形或長橢圓形。表面乳白色，光滑，偶有殘存的黃褐色種皮。一端鈍圓，另端較寬而微凹，有 1 淡棕色點狀種臍。背面圓凸，腹面有 1 條較寬而深的縱溝。顆粒飽滿圓潤，質堅實，斷面白色，粉性。有米香氣，味微甜。無雜質，無蟲蛀、霉變，無敗油味	大小較均勻，長 0.45-0.70cm，寬 0.45-0.60cm，具有米香氣，無碎粒
	統貨		大小不勻，長 0.45-0.80cm，寬 0.3-0.65cm，微有米香氣，碎粒 ≤3%
進口	/	乾貨。呈寬卵形或長橢圓形，顆粒相對較大。長 0.55-0.75cm，寬 0.65cm-0.80cm。表面乳白色，光滑，一端鈍圓，另端較寬而微凹，有 1 暗褐色點狀種臍。背面圓凸，腹面有 1 條較寬而深的縱溝。顆粒飽滿，斷面白色，粉性。氣微，味微淡。無雜質，無蟲蛀、霉變	

商品性狀特徵：

國產薏苡仁（寧化薏米 / 糯薏米）


- 呈不規則碎末狀
- 表面米白色，縱溝不明顯
- 質輕，具粉性，氣微



|| 國產薏苡仁（寧化薏米 / 糯薏米） ||

進口薏苡仁

- 呈寬卵形或長橢圓形
- 表面乳白色，光滑，偶有殘存的黃褐色種皮
- 一端鈍圓，另端較寬而微凹，有 1 暗褐色點狀種臍
- 背面圓凸，腹面有 1 條較寬而深的縱溝
- 質堅實，斷面白色，粉性
- 氣微，味微甜




|| 進口薏苡仁 ||

附：香港常見商品規格

熟薏米


- 呈不規則球形或橢圓形，形似爆谷
- 表面膨脹，黃白色，腹面有 1 條較寬而深的縱溝
- 質輕，氣微



|| 進口薏苡仁：熱膨化處理 ||

糙薏米

- 呈寬卵形或長橢圓形
- 表面粗糙，具黃褐色或紅棕色的種皮
- 背面圓凸，腹面有 1 條較寬而深的縱溝
- 質堅實，氣微



|| 進口薏苡仁：去外殼但保留糠層 ||

附：香港常見混淆商品

熟(白)高粱 為禾本科植物高粱 *Sorghum bicolor* (L.) Moench. 的種仁。秋季種子成熟後採收，曬乾。高粱，又名二色高粱，原產於非洲，約於宋遼時期經印度傳入中國。香港現時購得的熟薏米多屬此商品。

- 呈扁類圓形
- 表面光滑、亮白色。腹溝深嵌已膨化的胚乳，有 1 淡棕色點狀種臍
- 質輕，氣微



|| 熟(白)高粱：熱膨化處理 ||

洋薏米 本品為禾本科植物大麥 *Hordeum vulgare* L. 磨去殼皮的種仁。原產地為荷蘭，歐洲地方及中國大陸等地方亦有栽培。

- 呈長橢圓形，兩端較尖
- 表面光滑、淺棕色。腹溝淺而細，近線狀
- 質輕，氣微



|| 洋薏米 ||

第三章 全草及其他類

石斛

來源：本品為蘭科植物金釵石斛 *Dendrobium nobile* Lindl.、霍山石斛 *D. huoshanense* C. Z. Tang et S. J. Cheng、鼓槌石斛 *D. chrysotoxum* Lindl. 或流蘇石斛 *D. fimbriatum* Hook. 的栽培品及其同屬植物近似種的新鮮或乾燥莖。全年均可採收，鮮用者除去根和泥沙；乾用者採收後，除去雜質，用開水略燙或烘軟，再邊搓邊烘曬，至葉鞘搓淨，乾燥。

注：通過對產地及市場調查，目前銷售主流石斛同屬植物近似種有：矮石斛 *D. bellatulum* Rolfe、齒瓣石斛 *D. devonianum* Paxt.、束花石斛 *D. chrysanthum* Wall. ex Lindl.、細葉石斛 *D. hancockii* Rolfe、疊鞘石斛 *D. aurantiacum* Rchb. f. var. *denneanum* (Kerr.) Z. H. Tsi、美花石斛 *D. loddigesii* Rolfe、細莖石斛 *D. moniliforme* (L.) Sw。

產地：雲南、浙江、廣東、廣西、貴州、四川等地。

商品規格劃分：1. 鮮石斛、2. 藥典品種（金釵石斛、霍山石斛、鼓槌石斛、流蘇石斛）、3. 藥典同屬植物近似品種（矮石斛、齒瓣（紫皮）石斛、束花石斛、細葉石斛、疊鞘石斛、美花石斛、細莖（銅皮）石斛）

要求：無枯死草、無蟲蛀、無霉變。

常見商品名稱：楓斗、小環釵、米斛。

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
鮮石斛	統貨	鮮品。呈圓柱形或扁圓柱形，長約 30cm，直徑 0.4-1.2cm。表面黃綠色，光滑或有縱紋，節明顯，色較深，節上有膜質葉鞘。肉質多汁，易折斷。氣微，味微苦而回甜，嚼之有黏性	
藥典品種	金釵石斛	統貨	乾品。呈扁圓柱形，長 20-40cm，直徑 0.4-0.6 cm，節間長 2.5-3cm。表面金黃色或黃中帶綠色，有深縱溝。質硬而脆，斷面較平坦而疏鬆。氣微，味苦
	霍山石斛	統貨	乾品。呈類圓柱形或類圓錐形，長 1-12cm，直徑 0.1-0.4cm。外表面黃綠色，有細皺紋。質硬而脆，易折斷，斷面平坦。氣微，味淡，嚼之微有黏性

	鼓槌石斛	統貨	乾品。呈粗紡錘形，中部直徑 1-3cm，具 3-7 節。表面光滑，金黃色，有明顯凸起的稜。質輕而鬆脆，斷面海綿狀。氣微，味淡，嚼之有黏性	
	流蘇石斛	統貨	乾品。呈長圓柱形，長 20-150cm，直徑 0.4-1.2cm，節明顯，節間長 2-6cm。表面黃色至暗黃色，有深縱槽。質疏鬆，斷面平坦或呈纖維性。味淡或微苦，嚼之有黏性	
藥典同屬植物近似品種	矮石斛	選貨	乾品。呈紡錘形，常彎曲，長 2.0-4.0cm，直徑 0.4-1.0cm，具 2-5 節，節間長 0.1-1.4cm。表面金黃色或棕黃色，有細密淺縱皺紋。質堅，易折斷，斷面灰白色，略顯纖維性。味淡，嚼之有黏性	顏色均勻，大小一致
		統貨		顏色均勻，大小不分
	齒瓣（紫皮）石斛	統貨	乾品。呈長圓柱形，長 20-60cm，直徑 0.2-0.4cm。表面黃綠色或灰綠色，有的帶有紫色，有細縱皺紋，節明顯，節上可見殘留的膜質葉鞘，多破碎成纖維狀。質堅實，略韌，斷面不平整，略顯纖維性。氣微，味淡，嚼之有黏滯感，有渣	
	束花石斛	統貨	乾品。呈細長圓柱形，長 50-150cm，直徑 0.3-0.6cm，常彎曲不挺直。表面金黃色或枯黃色，稜條不明顯而現縱皺紋。體輕質實，易折斷，斷面略具纖維性。氣淡，嚼之有黏性	
	細葉石斛	統貨	乾品。呈長圓柱形，長可達 80cm，直徑 0.2-1.0cm，節間 2.5-4.5cm，接近根部 1-3 節較細，以上較粗。表面黃色，暗黃色或金黃色，具深槽。近基部 1-2 節光滑無槽。上部多分枝，分枝細，形同竹丫，直徑 0.1-0.2cm，節間 0.5-2cm，光滑或具稀少的稜，節上可見花梗脫落後的疤痕。質硬，不易折斷，斷面不平，略呈纖維狀，無臭，味淡	
	疊鞘石斛	統貨	乾品。呈長圓柱形，長可達 200cm，直徑 0.3-1.0cm，節間長 2.5-4.0cm。表面黃色至黃綠色，具縱槽，上部多曲折，近基部光滑無槽。質脆易折斷，斷面纖維性。氣微，味微苦，嚼之有黏性	

藥典同屬植物近似品種	美花石斛	統貨	乾品。呈細長圓柱形，常彎曲、盤纏成疏鬆團狀，長 10-20cm，直徑 0.1-0.2cm，節間長 1.0-2.0cm。表面金黃色或枯黃色，有旋狀縱皺紋。質實體輕，易折斷，斷面顆粒狀或略呈纖維狀。無臭，味淡，嚼之有黏性
	細莖（銅皮）石斛	統貨	乾品。呈圓柱形，通常長 25-40cm，直徑 0.3-0.5cm。表面黃綠色或棕綠色。質硬而脆，易折斷，斷面平坦，灰白色。氣微，味微苦，嚼之少黏滯感，有渣

石斛基原複雜，僅從性狀難以判定，建議採用分子、化學等綜合手段予以鑒定。

商品性狀特徵：

藥典品種（鼓槌石斛）

- 呈粗紡錘形，具 3-7 節
- 表面光滑，金黃色，有明顯凸起的棱
- 質輕而鬆脆，斷面海綿狀
- 氣微，味淡，嚼之有黏性




|| 鼓槌石斛：段 ||

第三章 全草及其他類

藥典品種（金釵石斛）

- 呈扁圓柱形
- 表面金黃色或黃中帶綠色，有深縱溝
- 質硬而脆，斷面較平坦疏鬆
- 氣微，味苦

斷面平坦而疏鬆



具深縱溝

|| 金釵石斛：小段 ||

藥典品種（霍山石斛）

- 呈類圓柱形或類圓錐形
- 外表面黃綠色，有細皺紋
- 質硬而脆，易折斷，斷面平坦
- 氣微，味淡，嚼之微有黏性

外表面黃綠色，
有細皺紋



|| 霍山石斛 ||

- 扭成螺旋形或彈簧狀
- 外表面黃綠色，有細皺紋

螺旋形或
彈簧狀



|| 霍山石斛：楓斗 ||

冬蟲夏草

來源：本品為麥角菌科真菌冬蟲夏草菌 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座和幼蟲屍體的乾燥複合體。夏初子座出土、孢子未發散時挖取，曬至六七成乾，除去似纖維狀的附着物及雜質，曬乾或低溫乾燥。

產地：野生（西藏（那曲地區）；青海（玉樹地區）；四川（甘孜地區））。

名稱		描述
野生蟲草	西藏蟲草	在西藏那曲等地區採挖的冬蟲夏草藥材。表面淺黃色或棕黃色，頭部棕黃色，氣微腥
	青海蟲草	在青海玉樹等地區採挖的冬蟲夏草藥材。表面深黃色至黃棕色，頭部棕黃色，氣微腥
	四川蟲草	在四川甘孜等地區採挖的冬蟲夏草藥材。表面暗黃色或暗棕色，頭部紅棕色，氣腥
人工蟲草		透過人工培養技術，而非自然生長於野生蟲體內的蟲草。性狀、氣味與野生品有差異（如人工蟲草的草頭（子座）較為尖細，顏色也較淺，且表面可能會有不均勻的褐色斑塊；人工蟲草的蟲體也較大，環紋也較模糊，重量較野生蟲草輕等），需注意區分。

商品規格劃分：根據產地出產的野生冬蟲夏草再進行劃分。1. 選貨、2. 統貨。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、無雜質。

常見商品名稱：冬蟲草、蟲草、野生蟲草、那曲蟲草、玉樹蟲草、藏草、人工蟲草。

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵	
		共同點	區別點
選貨	一等	本品由蟲體與從蟲頭部長出的真菌子座相連而成。蟲體似蠶，長3-5cm，直徑0.3-0.8cm；表面深黃色至黃棕色，有環紋20-30個，近頭部的環紋較細；頭部紅褐色；腳8對，中部4對較明顯；質脆，易折斷，斷面略平坦，淡黃白色。子座細長圓柱形，長4-7cm，直徑約0.3cm；表面深棕色至棕褐色，有細縱皺紋，上部稍膨大；質柔韌，斷面類白色。氣微腥，味微苦	每公斤 ≤1500 條，無斷草、無穿條、無癘草、無死草、無黑草
	二等		每公斤 1500-2000 條，無斷草、無穿條、無癘草、無死草、無黑草
	三等		每公斤 2000-2500 條，無斷草、無穿條、無癘草、無死草、無黑草
	四等		每公斤 2500-3000 條，無斷草、無穿條
	五等		每公斤 3000-3500 條，無斷草、無穿條
	六等		每公斤 3500-4000 條，無斷草、無穿條
	七等		每公斤 4000-4500 條，無斷草、無穿條
統貨	/	不限制數條，無斷草、無穿條	

藥材市場冬蟲夏草價格較高，斷草與整根售價相差甚大，產地採挖時大多將品質好的斷草拼接成個子銷售，剩餘斷草品質堪憂，故不制定斷草規格。

商品性狀特徵：

冬蟲夏草（野生）

- 由蟲體與從蟲頭部長出的真菌子座相連而成
- 蟲體
 - ▶ 似蠶。表面深黃色至黃棕色，有環紋 20-30 個，近頭部的環紋較細；頭部紅棕色
 - ▶ 足 8 對，中部 4 對較明顯
 - ▶ 質脆，易折斷，斷面略平坦，淡黃白色
- 子座
 - ▶ 自蟲體頭部正頂端長出，多為單生，細長圓柱形
 - ▶ 表面深褐色至棕棕色，有細縱皺紋，上部稍膨大，末端漸尖
 - ▶ 質柔韌，斷面類白色
- 氣微腥，味微苦



|| 冬蟲夏草(野生) ||

附：其他常見商品規格

冬蟲夏草(人工)

- 性狀與冬蟲夏草(野生)相若
- 蟲體似蠶，蟲體為斑駁的棕黃色，可見淺黃色及深棕色斑點，無菌膜
- 蟲體頭部較野生要小，略顯紅棕色
- 子座細長圓柱形，整體較幼及短，表面灰棕色，有細縱皺紋
- 子座自蟲體頭部正頂端長出，多為單生
- 氣味較野生淡薄，氣微腥，味微苦
- 蟲體飽滿但相對較輕



|| 冬蟲夏草(人工) ||

附：香港常見混淆商品

亞香棒蟲草 為麥角菌科真菌亞香棒蟲草菌 *Cordyceps hawkesii* Gray 寄生在鱗翅目昆蟲幼蟲上的子座和幼蟲屍體的複合體。主要產地為安徽、湖南、湖北、江西等地。

- 蟲體
 - ▶ 似蠶。頭部紅黃色或紫黑色，體表棕黃色或灰黃色
 - ▶ 有 20-30 個環節，不清晰，粗糙
 - ▶ 足部不明顯，氣門點狀，黑色
 - ▶ 刮去外層灰白色菌膜，可見褐色蟲體角皮
 - ▶ 質脆，易折斷，斷面略平坦，黃白色
- 子座
 - ▶ 自蟲體頭部上面或側邊長出，子座單生或有分枝
 - ▶ 頭部短圓柱形，頂端圓鈍，灰白色或灰黑色，具縱紋
 - ▶ 質脆，易折斷，斷面疏鬆或有空隙
- 氣香，味微鹹（菌核）或淡（子座）



|| 亞香棒蟲草：染色，或剪去子座膨大部分 ||

茯苓

來源：本品為多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的乾燥菌核。多於 7-9 月採挖，挖出後除去泥沙，堆疊「發汗」後，攤開晾至表面乾燥，再「發汗」，反覆數次至現皺紋、內部水分大部散失後，陰乾，稱為「茯苓個」；或將鮮茯苓按不同部位切製，陰乾，分別稱為「茯苓塊」和「茯苓片」。

產地：雲南、湖北、安徽、貴州等地。

商品規格劃分： 1. 個苓、2. 白肉茯苓 (茯苓片 (白苓片)、白苓塊、白苓丁、白碎苓)、3. 赤肉茯苓 (赤苓塊、赤苓丁、赤碎苓)、4. 茯苓卷、5. 茯苓刨片。

要求：無變色、無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：茯苓、雲南茯苓、雲苓、茯苓個、茯苓卷、茯苓丁、茯苓粒、茯苓塊、茯苓片、白茯苓。

術語	定義
個苓	茯苓挖出後除去泥沙，堆置「發汗」後，攤開晾至表面乾燥，再「發汗」，反覆數次至表面現皺紋、內部水分大部分散失後，陰乾
茯苓片 (白苓片)	為茯苓去淨外皮，切成薄片。白色或灰白色。質細。多長方形或正方形，亦有不規則多邊形。修邊或毛邊
白苓塊	為茯苓去淨外皮切成扁平方塊。白色或灰白色。邊緣苓塊，可不成方形。間有 1.5cm 以上的碎塊。無雜質、霉變
白苓丁	為茯苓去淨外皮切成立方形塊。白色或灰白色。質堅實。長、寬、厚在 1cm 以內，均勻整齊。間有不規則的碎塊，但不超過 10%。無粉末、雜質、霉變
白碎苓	為加工茯苓時的白色或灰白色的大小碎塊或碎屑
赤苓塊	去淨外皮切成扁平方塊，淡紅或淡棕色，邊緣苓塊，可不成方形，間有 1.5cm 以上的碎塊。無雜質、霉變
赤苓丁	為茯苓去淨外皮切成立方形塊，淡紅色或淡棕色，質鬆，長、寬、厚在 1cm 以內，均勻整齊，間有不規則的碎塊，無粉末、雜質、霉變
赤碎苓	為加工茯苓時的淡紅色或淡棕色大小碎塊或碎屑
茯苓卷	為茯苓切成卷狀薄片，白色或灰白色，質細
茯苓刨片	為茯苓去淨外皮，切成薄片，呈不規則卷狀，白色或灰白色，質細

發汗	為藥材加工過程中，在藥材乾燥至一定程度後，將藥材堆積發熱，讓藥材內部水分外溢，而有利於乾燥的一種加工方式，可使藥材變軟、變色、增加香味或減少刺激性
水鏽	為茯苓表皮似鐵鏽、呈紅色的斑點

外觀等級劃分：

規格		等級		性狀特徵		
				共同點	區別點	
個苓	選貨	/	大小不一，呈不規則圓球形或塊狀，表面黑褐色或棕褐色。斷面白色。氣微，味淡。無雜質、霉變	體堅實、皮細，完整。部分皮粗、質鬆，間有土沙、水鏽、破傷，不超過總數的 20%		
	統貨	/		質地不一，部分鬆泡，皮粗或細、間有土沙、水鏽、破傷		
白肉茯苓	茯苓片 (白苓片)	選貨	一等	不規則圓片狀或長方形，大小不一，含外皮，邊緣整齊，厚度不小於 3mm	色白，質堅實，邊緣整齊	
		選貨	二等		色灰白，部分邊緣略帶淡紅色或淡棕色，質鬆泡，邊緣整齊	
	統貨	/	色灰白，部分邊緣略帶淡紅色或淡棕色，質地不均，邊緣整齊			
	白苓塊	選貨	一等		呈扁平方塊，邊緣苓塊可不成方形，無外皮，色白，大小不一，寬度最低不小於 2cm，厚度在 1cm 左右	質堅實
選貨		二等	質鬆泡，部分邊緣為淡紅色或淡棕色			
統貨		/	質地不均，部分邊緣為淡紅色或淡棕色			

白肉茯苓	白苓丁	選貨	一等	呈立方形塊，部分形狀不規則，一般在 0.5-1.5cm 之間	色白，質堅實，間有少於 5% 的不規則的碎塊
			二等		色灰白，質鬆泡，間有少於 10% 的不規則的碎塊
	統貨	/	色白或灰白，質地不均，間有不少於 10% 的不規則的碎塊		
	白碎苓	統貨	/	加工過程中產生的白色或灰白色茯苓，碎塊或碎屑，體輕、質鬆	
赤肉茯苓	赤苓塊	統貨	/	呈扁平方塊，邊緣苓塊可不成方形，無外皮，色淡紅或淡棕，質鬆泡，大小不一，寬度最低不小於 2cm	
	赤苓丁	選貨	/	呈立方形塊，部分形狀不規則，一般在 0.5-1.5cm 之間	色淡紅或淡棕，質略堅實，間有少於 10% 的不規則的碎塊
		統貨	/		間有不少於 20% 的不規則的碎塊
	赤碎苓	統貨	/	為加工過程中產生的淡紅色或淡棕色大小形狀不規則的碎塊或碎屑，體輕、質鬆	
	茯苓卷	統貨	/	呈卷狀薄片，白色或灰白色，質細，無雜質，長度一般為 6-8cm，厚度小於 1mm	
	茯苓刨片	統貨	/	呈不規則卷狀薄片，白色或灰白色，質細，易碎，含 10%-20% 的碎片	

- 1: 本標準規格等級在《七十六種藥材商品規格標準》的基礎上增加了赤苓丁、茯苓刨片、茯苓卷等四個規格，刪掉了茯神木的規格，將白苓片的名字名稱改為茯苓片（白苓片）、般方的名稱改為白苓丁，調整後的規格等級更符合實際流通情況。
- 2: 茯苓片（白苓片）從 2-20cm、白苓丁從 0.5-1.5cm 大小的均有，且多存在使用企業定制加工的情況，要求不一，不為市場廣泛流通，故未將不同大小的茯苓片（白苓片）、白苓丁納入本標準中。

商品性狀特徵：

個苓


- 呈不規則圓球形或塊狀
- 表面黑褐色或棕褐色，斷面白色
- 氣微，味淡
- 無雜質、霉變



|| 個苓 ||

茯苓片


- 呈不規則圓片狀或長方形，大小不一，邊緣整齊，厚度不小於 3mm
- 色白，質堅實，邊緣整齊



|| 茯苓片 ||

白苓丁


- 呈立方形塊，部分形狀不規則，一般在 0.5-1.5cm 之間
- 色白或灰白
- 質堅實，間有不規則的碎塊



|| 白肉茯苓：切丁 ||

茯苓卷

- 呈卷狀薄片
- 白色或灰白色
- 質細，無雜質



|| 茯苓卷：切卷狀薄片 ||

鐵皮石斛

來源：蘭科植物鐵皮石斛 *Dendrobium officinale* Kimura et Migo 的乾燥莖。每年 11 月至翌年 3 月採收，除去雜質，剪去部分鬚根，邊加熱邊扭成螺旋形或彈簧狀，烘乾；或切成段，乾燥或低溫烘乾。前者習稱「鐵皮楓斗」（耳環石斛）；後者習稱「鐵皮石斛」。

以下是市場出現的六大雜類楓斗，均不是藥典收載品，需仔細辨別混淆品。

雜類楓斗（混淆品）	描述
細莖石斛楓斗	來源於細莖石斛（銅皮石斛），加工後稱「銅皮斗」，按顏色再分為「烏銅皮」和「黃銅皮」
紫皮楓斗	來源於紫皮石斛，又稱「齒瓣石斛」，加工後稱「紫皮斗」，嫩莖加工成的稱「紫皮芽」
水草楓斗	來源於腫節石斛、束花石斛、玫瑰石斛及報春石斛。主要是應用一些植株高大、具肉質粗壯莖、含水量較多的石斛植物加工而成的楓斗
蟲草楓斗	來源於梳唇石斛、藏南石斛及翅萼石斛加工成的楓斗，主要有兩種形式，包括「蟲草」和「包蟲」
剛節楓斗	來源於杯鞘石斛、疏花石斛、晶帽石斛、兜唇石斛、疊鞘石斛、以及未能鑒定其學名的「小剛節」（莖節略為膨大的石斛）加工而成
其他	來源於翅梗石斛、大苞鞘石斛、細葉石斛、黑毛石斛、矮石斛、重唇石斛、美花石斛等

產地：雲南、浙江、安徽等地。

商品規格劃分：1. 鐵皮楓斗、2. 鐵皮石斛。

要求：無蟲蛀、無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：鐵皮石斛、鐵皮楓斗（鐵皮斗）、西楓斗、黑節草。

術語	定義
鮮莖	指鐵皮石斛的新芽生長至第二年後，通過挑選、除雜、去葉去根得到的鮮莖
螺旋形	指鐵皮楓斗旋與旋之間緊貼，密實度好
彈簧狀	指鐵皮楓斗旋與旋之間較鬆散，密實度較差

外觀等級劃分：

規格	等級	性狀特徵								
		形狀	旋紋	平均單重/g	直徑/cm	表面特徵	質地	斷面	氣味	其他
鐵皮楓斗	特級	螺旋形	一般2-4個旋紋	0-0.5	/	色暗綠色或黃綠色，表面略帶角質樣光澤，有細縱皺紋	質堅實，易折斷	斷面平坦，略角質狀	氣微味淡，嚼之有黏性	久嚼有濃厚的黏滯感，殘渣極少
	優級	螺旋形	一般4-6個旋紋	≥0.5	/					
	一級	螺旋形或彈簧狀	一般2-4個旋紋	0-0.5	/	色黃綠色或略金黃色，有細縱皺紋				久嚼有濃厚的黏滯感，略有殘渣
	二級	螺旋形或彈簧狀	一般4-6個旋紋	≥0.5	/					久嚼有濃厚的黏滯感，有少量纖維性殘渣


鐵皮石斛	一級	呈圓柱形的段，長短均勻	/	0.2-0.4	色黃綠色或略金黃色，兩端不得發霉	質堅實，易折斷	斷面平坦，略角質狀	氣微味淡，嚼之有黏性	久嚼有濃厚的黏滯感，略有殘渣
	二級	呈圓柱形的段，長短不一	/	0.2-0.4					久嚼有濃厚的黏滯感，有少量纖維性殘渣

藥典對鐵皮石斛的採收時間有相應的要求，即 11 月至翌年 3 月，而目前市場上有不符合藥典規定的片和鮮品規格，因此本次標準不制定片和鮮品的規格。

商品性狀特徵：

鐵皮楓斗

- 呈螺旋形或彈簧狀，通常為 2-6 個旋紋
- 表面黃綠色或略帶金黃色，有細縱皺紋
- 質堅實，易折斷，斷面平坦，略為角質狀
- 氣微，味淡，嚼之有黏性，久嚼有濃厚的黏滯感，略有殘渣



|| 鐵皮楓斗 ||

鐵皮石斛

- 呈圓柱形的段，長短不等，呈略彎曲細長條狀
- 表面青黃色至暗黃色，具細緻縱皺紋，節間顏色略淺，結節明顯。表面偶有灰白色絲狀纖維
- 質堅實，柔韌有彈性



|| 鐵皮石斛 ||

附：其他常見商品規格

鐵皮石斛片

- 呈長圓形片狀，表皮金黃色至青黃色，具細緻縱皺紋
- 切面淺黃色或青綠色，纖維狀，表面可見絲狀纖維
- 質堅實



|| 鐵皮石斛：斜切 ||

靈芝

來源：本品為多孔菌科真菌赤芝 *Ganoderma lucidum* (Leys. ex Fr.) Karst. 或紫芝 *G. sinense* Zhao, Xu et Zhang 的乾燥子實體。全年採收，除去雜質，剪除附有朽木、泥沙或培養基質的下端菌柄，陰乾或在 40-50°C 烘乾。

產地：浙江、福建、河北、山西、江西、廣西等地。

商品規格劃分：1. 野生靈芝 (赤芝、紫芝)；2. 培植赤芝 (段木赤芝 [未產孢]、段木赤芝 [產孢]、代料赤芝 [未產孢]、代料赤芝 [產孢])；3. 培植紫芝 (段木紫芝、代料紫芝)。

要求：無霉變、雜質少於 3%。

常見商品名稱：靈芝片、赤靈芝、赤靈芝片、黑靈芝、黑靈芝片、野生靈芝。

術語	定義
段木	以殼斗科、杜英科、金縷梅科等闊葉樹為主要樹木，將其截成一定規格的木段作為靈芝栽培基質
代料	以木屑、麩皮等為主要培養料，經混合加工而製成的靈芝栽培基質

外觀等級劃分：

規格		等級	性狀特徵						
			朵形	色澤	質地	菌蓋直徑 (cm)	菌蓋厚度 (cm)	菌柄長度 (cm)	氣味
野生靈芝	野生赤芝	統貨	菌蓋完整，有叢生，疊生混入	蓋面紅褐色至棕褐色，稍有光澤。腹面淺褐色	木栓質，質密	≤10	≤1.0	長短不一	氣微香，味苦澀
	野生紫芝	統貨		蓋面紫黑色，有漆樣光澤。腹面鏽褐色					氣微香，味淡

培植赤芝	段木赤芝（未產孢）	特級	菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形	蓋面紅褐色至紫紅色，有光澤，腹面黃白色，乾淨	木栓質，質重，密實	≥20	≥2.0	≤2.5	氣微香，味苦澀
		一級		蓋面紅褐色，有光澤，腹面黃白色或淺褐色，乾淨		≥15			
		統貨	菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形，或有叢生、疊生混入	蓋面黃褐色至紅褐色，腹面黃白色或淺褐色		≥10	≥1.0	長短不一	
	段木赤芝（產孢）	統貨	菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形，或有叢生、疊生混入	蓋面黃褐色至紅褐色，皺縮，光澤度不佳，腹面棕褐色或可見明顯管孔裂痕	木栓質，質地稍疏鬆	≥10	≥0.5	長短不一	氣微香，味苦澀
		代料赤芝（未產孢）	統貨	外形呈傘狀，菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形	蓋面黃褐色至紅褐色，腹面黃白色或淺褐色	木栓質，質地稍疏鬆			≥6

培植赤芝	代料赤芝（產孢）	統貨	外形呈傘狀，菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形	蓋面黃褐色至紅褐色，皺縮，光澤度不佳，腹面棕褐色或可見明顯管孔裂痕	木栓質，質地稍疏鬆	≥6	≥0.5	長短不一	氣微香，味苦澀
培植紫芝	段木紫芝	統貨	外形呈傘狀，菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形	蓋面紫黑色，有漆樣光澤，腹面鏽褐色	木栓質，質重，密實	≥10	≥1.0	長短不一	氣微香，味淡
	代料紫芝	統貨			木栓質，質地稍疏鬆	≥6	≥0.5		

- 市場另有樹舌等與靈芝同屬的多孔菌科，需注意區分。
- 市場上大部分靈芝都是彈射靈芝孢子粉的，只是彈射的時間長短不一樣。很少存在完全未產孢的靈芝。
- 商家為了便於儲存，防止蟲蛀等，有部分靈芝經過蒸後乾燥，不符合藥典陰乾或在 40~50°C 烘乾。
- 市場上存在用栽培品中個子較小，形態不一的靈芝冒充野生靈芝的行為。

商品性狀特徵：

段木赤芝（未產孢）

- 菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形
- 蓋面紅褐色至紫紅色，有光澤；腹面黃白色，乾淨
- 菌肉白色至淡棕色
- 菌柄圓柱形，常側生，與蓋面同色，光亮

菌柄與蓋面同色，光亮，常側生



菌蓋完整，腎形

蓋面紅褐色至紫紅色，有光澤

|| 段木赤芝（未產孢）：培植 ||

代料赤芝（未產孢）

- 外形呈傘狀，菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形
- 皮殼堅硬，蓋面紅褐色，有光澤，具環狀棱紋和輻射狀皺紋
- 邊緣黃白色至淺黃褐色，薄而平截，常稍內捲
- 腹面黃白色，乾淨
- 切片後可見淺棕色菌肉
- 菌柄圓柱形，常側生，與蓋面同色，有光澤



|| 代料赤芝（未產孢）：培植（林下仿野生） ||

段木紫芝

- 外形呈傘狀，菌蓋完整，腎形、半圓形或近圓形
- 蓋面紫黑色，有漆樣光澤，腹面鏽褐色
- 菌肉白色至淡棕色
- 菌柄圓柱形，常側生，與蓋面同色，光亮



|| 段木紫芝：培植 ||

附：靈芝常見混淆品

硬孔靈芝（黑靈芝） 為多孔菌科真菌硬孔靈芝 *Ganoderma duropora* Lloyd 的子實體。全年採收，除去雜質，剪除附有朽木、泥沙或培養基質的下端菌柄，乾燥。主產東南沿海、長江中下游和大小興安嶺地區。

- 菌蓋呈正圓形或圓形，中央下凹似漏斗狀
- 皮殼堅硬，表面紫黑色或深黑色，有漆樣光澤，具明顯或不明顯環狀棱紋及明顯的放射狀縱皺或皺褶，凹凸不平
- 邊緣稍薄或銳，略向內卷，波曲狀
- 菌柄圓柱形，生於菌蓋下方中央，與菌蓋同色，均有漆樣光澤
- 孔面紫褐色，切片後可見菌肉和菌管呈深褐色



|| 硬孔靈芝：栽培 ||

附錄

附錄：常用中藥材傳統經驗通用鑒別術語

統貨	對藥材品質好壞、個頭大小等，不進行區分。
選貨	對藥材品質好壞進行區分，個頭大小等進行分揀，以劃分出等級。
乾貨	藥材所含的水分，以不致引起霉爛變質的貨品。
油條(個、爛、塊)	藥材堆存發熱、烘炕不當、氣候影響等因素引起的返油變色。
粉性(粉質、粉狀)	對藥材內部或斷面質地的一種描述，主要指藥材細胞中含有較多的澱粉，乾燥後呈細粒狀或細砂狀，折斷後有粉塵飛出。
亮銀星	某些藥材的一些成分在表面常常析出結晶，在光照下可見點狀閃光。
花紋	根及根莖類藥材斷面所呈現的紋理。一般分為環紋、線紋、網紋、雲紋、車輪紋、檳榔紋、裂紋等。
空泡	藥材加工時用火烘烤過快而形成的中心空隙。
油頭	藥材根頭部呈黑色發黏的油狀物。
亮星	藥材橫切後在陽光下透視，所能見到發亮的黏液質小點。
菊花心	藥材橫切面上維管束與較窄的射線排列形成細密放射狀紋理，狀似開放的菊花。
珍珠盤	藥材根頭部膨大，具有多數隆起的莖基及芽痕，形狀似珍珠散於盤中。
金井玉欄	根類藥材的斷面週邊白，內心黃，中間有一棕色的形成層環，又稱「金心玉欄」。
蜘蛛網紋	藥材橫切面上木質部大型導管呈針孔狀多層整齊排列，與類白色的射線相間而呈蜘蛛網狀紋理。
筋脈	指藥材組織的纖維束或維管束。藥材折斷後其纖維束或維管束呈參差不齊的絲狀，猶如人體的筋脈，又稱「筋」。其在整齊的藥材切面上所表現出的點狀痕跡稱為「筋脈點」。較大的維管束痕亦稱「筋脈紋」。
鬚眼	指果實類藥材果皮表面的油室，為緊密排列的小圓點，對光照射清晰透明，如陳皮。
皮鬆肉緊	指部分根類藥材的橫斷面皮部疏鬆，而木部較為結實。
同心環	指根類藥材橫切面有數輪同心排列環紋的異性構造，較大者形似羅盤，又稱「羅盤紋」。
朱砂點	指藥材平整橫切面上可見散在的、色如朱砂的麻點，主要是油室及其分泌物。

砂眼	指根及根莖類藥材表面具有的多數圓形孔狀凹陷的鬚根痕點，又稱「沙眼」。
車輪紋	指藥材斷面木質部射綫呈均勻放射狀排列的紋理，古文亦稱之為「車輻」。
疙瘩	泛指藥材表面上突起部分。因藥材不同，疙瘩在植物學所指的也不一樣。對於天南星而言，是指突起的圓芽。
柴性	一般指質地堅硬而易折的根或根莖類藥材，木化程度高，折斷呈乾柴狀。
骨	泛指某些藥材的木質化程度較高的部分。
掃帚頭	指根及根莖類藥材頂端的纖維性毛狀殘存葉基，形如掃帚。
螺紋	指根及根莖類藥材表面上螺旋形的環紋。
霜	一般指藥材內部乾燥後，在表面析出的白色物質。如蒼朮飲片析出的毛絮狀結晶（茅朮醇），習稱「起霜」；丹皮、厚朴等所起的霜亦多系結晶性物質。
顆粒性	指藥材斷面呈細小的顆粒狀，是由較大的石細胞群所組成。
黏性	指某些含有黏液汁的藥材所表現的特性。一般用嘴咬、手捏、口含、水潤化等方法查驗。
羅盤紋	指根類藥材橫切面有數輪同心排列環紋的異形構造，形似羅盤，又稱「同心環」。
寶光	多指某些質地堅硬、斷面呈角質狀的藥材所具有的寶石樣光澤。
鐵骨	指藥材內部（中心）似鐵色，質堅硬如骨，體重而堅實不易折斷。
腿	一般是指根及根莖類藥材的支根。也稱為「尾」。
齊手	一般指將藥材切成薄片後整齊放、修邊，並以宣紙等方式扎起成捆。現已成為中藥特色商品規格之一。

參考資料

中華中醫藥學會 (2016)。《中藥材商品規格等級標準編制通則》(TCACM1021.1-2016)。中國商務部。

中華中醫藥學會 (2018)。《中藥材商品規格等級》(T/CACM1021.[2-226]-2018)。中華中醫藥學會。

周濃，李偉東 (2023)。《中國川貝母》。中國中醫藥出版社。

國家藥典委員會 (2020)。《中華人民共和國藥典》(一部)。中國醫藥科技出版社。

區靖彤 (2024)。《中醫藥食療手冊 2·靚料·煲靚湯》。萬里機構。

張鏡湖，何鏡華，藍水中 (1993)。《實用中藥炮製》。廣東科技出版社。

陳新滋、楊大堅、區靖彤、莫錦華、陳四保 (2013)。《名貴藥材鑑別》。天地圖書有限公司。

趙中振，陳虎彪 (2013)。《常用中藥材鑑別圖典》(修訂本)。萬里機構。

(清)鄭奮揚，曹炳章 (增訂) (2022)。《增訂偽藥條辨》。中國中醫藥出版社。

中藥材商品規格小冊子

統籌

香港中藥藥劑師協會

主編

周若龍

裝幀設計與排版

4 Dream Design Studio

攝影

陳倬賢、溫劍忠

出版者

香港中藥藥劑師協會

出版日期

2025 年 9 月

版權所有，不准翻印

鳴謝

- 感謝曾福記、協和藥業有限公司、利源豐國際貿易有限公司提供藥材以供拍照。
- 此物品 / 活動由香港特別行政區政府的專業服務協進支援計劃資助。

免責聲明

在此刊物 / 本項目的任何活動中提出的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府及專業服務協進支援計劃評審委員會的觀點。



網頁：<https://www.cmpa.org.hk>

電郵：hkcempa@gmail.com

Facebook：香港中藥藥劑師協會

Instagram：hkcempa

電話 /Whatsapp：5485 5871

撥款資助：



此物品 / 活動由香港特別行政區政府的專業服務協進支援計劃資助。
在此刊物 / 本項目的任何活動中提出的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府及專業服務協進支援計劃評審委員會的觀點。